


الولاء في الكيمياء

20 الصف : العاشر

22 الفصل الدراسي الثاني


العام الدراسي
(2021/2022)



إعداد المعلمة :

ولاء شعوانة






الكيميائيون

أكثر الناس تفاعلاً ؛ لأن عقولهم فيها استقرار

ولغتهم واضحة فيها التأكد و اختزال

وأفكارهم مفهومة فيها الانماج



لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على تلفونك

و آراءهم صائبة

وإذا أغضبهم أحد يلجأون للحذف و الحرق التام

المعلمة : ولاء شعواطة

المادة : كيمياء

الوحدة الرابعة: التفاعلات والحسابات الكيميائية

** جدول يبين أهم الرموز الكيميائية :

العناصر أحادية التكافؤ (موجبة الشحنة)		
اسم العنصر	الرمز	الأيون
الهيدروجين	H	H^+
البوتاسيوم	K	K^+
الصوديوم	Na	Na^+
الفضة	Ag	Ag^+

العناصر ثنائية التكافؤ (موجبة الشحنة)		
اسم العنصر	الرمز	الأيون
الكالسيوم	Ca	Ca^{+2}
الباريوم	Ba	Ba^{+2}
الخرصين	Zn	Zn^{+2}
المغنيسيوم	Mg	Mg^{+2}
النحاس	Cu	Cu^{+2}

العناصر ثلاثية التكافؤ (موجبة الشحنة)		
اسم العنصر	الرمز	الأيون
الألمنيوم	Al	Al^{+3}
الحديد	Fe	Fe^{+3}

العناصر ثلاثية التكافؤ (سالبة الشحنة)		
اسم العنصر	الرمز	الأيون
النيتروجين	N	N^{-3}
الفسفور	P	P^{-3}


العناصر سالبة الشحنة (الافلزات)		
اسم العنصر	الرمز	الأيون
الكلور	CL	CL^-
البروم	Br	Br^-
اليود	I	I^-
الأكسجين	O	O^{-2}
الكبريت	S	S^{-2}

مميزات الحموض :

- 1- طعمه حامض.
- 2- تشترك الحموض في احتوائها على أيون (H^+).
- 3- يدخل الحمض في العديد من الصناعات مثل :
حمض النيتريك HNO_3 يدخل في صناعة الأسمدة
وحمض (HCl) الهيدروكلوريك يوجد في المعدة.
- 4- تغير لون ورقة تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر ولا تؤثر في الورقة الحمراء
- 5- محاليل الأحماض جيدة التوصيل للكهرباء

1

للحديد تكافؤين ثنائي وثلاثي :



للمرصاص تكافؤين ثنائي ورباعي :





مميزات القواعد :

1- القاعدة مادة يحتوي محلولها أيونات الهيدروكسيد (OH⁻).

3- طعمها مر

4-لملمسها صابوني .

5- يغير لون ورقة تباع

الشمس من الأحمر إلى الأزرق

ولا يؤثر في الورقة الزرقاء

* محلول القواعد

موصول للتيار



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

أهم الغازات

اسم الغاز	صيغته	اسم الغاز	صيغته
الهيدروجين	H ₂	النشادر (الأمونيا)	NH ₃
الأكسجين	O ₂	أول أكسيد الكربون	CO
النيتروجين	N ₂	ثاني أكسيد الكربون	CO ₂
الكلور	CL ₂	ثاني أكسيد الكبريت	SO ₂
كبريتيد الهيدروجين	H ₂ S	ثاني أكسيد النيتروجين	NO ₂

أهم الحموض

الحمض	صيغة الحمض
حمض الهيدروكلوريك	HCL
حمض النتريك	HNO ₃
حمض الأسيتيك	CH ₃ COOH
حمض الكبريتيك	H ₂ SO ₄
حمض الكربونيك	H ₂ CO ₃
حمض الفوسفوريك	H ₃ PO ₄



أهم القواعد

القاعدة	صيغة القاعدة
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH
هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH
هيدروكسيد الأمونيوم	NH ₄ OH
هيدروكسيد الكالسيوم	Ca(OH) ₂

** خطوات كتابة الصيغ الكيميائية :

كبريتات الكالسيوم

كلوريد المغنيسيوم



أ) تكتب اسم المركب

ب) تكتب رمز كل عنصر.

ج) تضع تكافؤ كل عنصر.

د) تبادل التكافؤات

هـ) إذا كان بين أرقام الذرات عامل مشترك نقسم عليه للحصول على أبسط قيمة عددية.

و) عند تسمية المركب نبدأ باسم الأيون السالب مضافاً له المقطع (يد) ثم نتبعه بالأيون الموجب

** الجدول التالي يحتوي بعض المجموعات الأيونية :

المجموعة الأيونية	الهيدروكسيد	النترات	الكربونات	الكبريتات	الفسفات	الأمونيوم
الصيغة	$[\text{OH}]^-$	$[\text{NO}_3]^-$	$[\text{CO}_3]^{2-}$	$[\text{SO}_4]^{2-}$	$[\text{PO}_4]^{3-}$	$[\text{NH}_4]^+$
الشحنة	-1	-1	-2	-2	-3	+1



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيه على موقع دبرني

اكتب صيغ المركبات الآتية ؟

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

** هيدروكسيد المغنيسيوم :

** هيدروكسيد الأمونيوم :

** كبريتات الصوديوم :

** كربونات المغنيسيوم :

** فسفات الكالسيوم :

الصيغ الكيميائية

الهدف: يكتب الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية و المركبات المشتركة.


المحتوى:

* من المجموعات الأيونية:


الكربونات $[\text{CO}_3]^{-2}$ ، النترات $[\text{NO}_3]^{-1}$ ، الكبريتات $[\text{SO}_4]^{-2}$ ، الفوسفات $[\text{PO}_4]^{-3}$

مثال: اكتب الصيغة الكيميائية لكل من (أكسيد البوتاسيوم – كبريتات الصوديوم)

كبريتات الصوديوم



أكسيد البوتاسيوم



(أ) نكتب اسم المركب

(ب) نكتب رمز كل عنصر.

(ج) نضع تكافؤ كل عنصر.

(د) تبادل التكافؤات.

(هـ) إذا كان بين أرقام الذرات عامل مشترك نقسم عليه للحصول على أبسط قيمة عددية.

السؤال الأول: اكتب الصيغة الكيميائية لكل مما يلي:

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

****كلوريد الحديد**

****أكسيد المغنيسيوم**

****بروميد الكالسيوم**

****أكسيد الألمنيوم**

****كبريتيد الحديد**

السؤال الثاني: اكتب الصيغة الكيميائية لكل مما يلي:

****نترات البوتاسيوم**

****كلوريد الأمونيوم**

****كربونات الكالسيوم**

****فوسفات الصوديوم**

السؤال الثالث: ما هي الصيغة الصحيحة لمركب أكسيد الصوديوم من الصيغ التالية:


NaO -3

NaO₂ -2


Na₂O -1

السؤال الأول: اكتب صيغة المركبات الآتية ؟

اسم المركب	صيغة المركب
أكسيد الخارصين	
كبريتيد الحديد III	
كربونات المغنيسيوم	
هيدروكسيد الكالسيوم	
يوديد النحاس I	
نترات النحاس II	
فوسفات البوتاسيوم	
كبريتيد الصوديوم	
أكسيد البوتاسيوم	
أكسيد الرصاص IV	
أكسيد الرصاص II	
هيدروكسيد الأمونيوم	
نترات الحديد II	
فوسفيد الصوديوم	



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



اكسيد البوتاسيوم



أكسيد الرصاص II

هيدروكسيد الأمونيوم

نترات الحديد II

فوسفيد الصوديوم

اهم المفاهيم & المصطلحات

Chemical Change	تغير كيميائي
Physical Change	تغير فيزيائي
Chemical Formula	الصيغة الكيميائية
Chemical Equation	المعادلة الكيميائية
Balanced Chemical Equation	المعادلة الكيميائية الموزونة
Chemical Interaction	التفاعل الكيميائي
Law of Conservation of Mass	قانون حفظ الكتلة
Combustion Reaction	تفاعل الاحتراق
Combination Reaction	تفاعل الاتحاد
Synthesis Reaction	تفاعل التكوين أو التحضير
Decomposition Reaction	تفاعل التحلل (التفكك)
Thermal Decomposition Reactions	تفاعل التحلل (التفكك) الحراري
Displacement Reactions	تفاعلات الإحلال
Single Displacement Reaction	تفاعل الإحلال الأحادي
Double Displacement Reaction	تفاعل الإحلال المزدوج
Precipitation Reaction	تفاعلات الترسيب
Neutralisation Reaction	تفاعلات التعادل
Ionic Equation	المعادلة الأيونية
Spectator Ions	الأيونات المتفرجة
Net Ionic Equation	المعادلة الأيونية النهائية (الصافية)

- اذكر أنواع التغيرات التي تطرأ على المادة ؟

1- تغير فيزيائي :

هو تغير في الخواص الفيزيائية للمادة كالشكل والحجم وحالة المادة (سائلة – صلبة – غازية) ولا ينتج عنه مواد جديدة.



أمثلة على التغير الفيزيائي

(1) الفلزات قابلة للطرق والتشكيل (أسلاك الكهرباء).

(2) انصهار الثلج .

(3) انصهار الشمع .

(4) غليان الماء .

(5) تجمد الماء

(6) ذوبان ملح الطعام في الماء



صلب

سائل

غاز

2- تغير كيميائي : هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في صفاتها وخصائصها عن المواد الأصلية.

مثل :


كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

1- احتراق عنصر المغنيسيوم بوجود غاز الأكسجين ينتج رماد أبيض اللون
يسمى أكسيد المغنيسيوم MgO

حيث أن : أكسيد المغنيسيوم يختلف في خصائصه عن خصائص كل من
العنصرين المغنيسيوم والأكسجين (مكوناته)



المغنيسيوم



لهب



أكسيد المغنيسيوم



المغنيسيوم

أكسجين

7

أكسيد المغنيسيوم

Watermarkly

2- تكون ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) من الكلور والصوديوم

حيث أن :

الصوديوم فلز يتفاعل بشدة مع الماء
أما الكلور فغاز سام لونه أصفر مخضر

ينتج عن تفاعلهما مركب كلوريد الصوديوم NaCl (ملح الطعام) الأبيض والذي يحتاجه الجسم



الصوديوم



الكلور



كلوريد الصوديوم



- عرف التفاعل الكيميائي ؟ هو تغير يطرأ على المواد يتضمن تكسير روابط وتكوين روابط جديدة ويؤدي إلى إعادة ترتيب الذرات بحيث تنتج مواد جديدة تختلف في صفاتها الفيزيائية والكيميائية عن المواد المتفاعلة

- عدد الدلالات التي تدل على حدوث التفاعل الكيميائي ؟

1- تكون راسب

2- انطلاق الغازات

3- حدوث تغير في ألوان المواد

4- تغير في درجة حرارة التفاعل

تغيرات المادة

تغيرات كيميائية

تتبعها

أدلة حدوثها

عملية تتضمن تغير مادة
أو أكثر إلى مواد
جديدة، و يسمى أيضاً
التفاعل الكيميائي

تغير اللون
تغير الرائحة
تغير الطعم
تكون راسب
تصاعد غاز

أمثلة

صدأ الحديد
تعتن الخبز
احتراق الفحم

تغيرات فيزيائية

تتبعها

تغير يؤثر في الخواص
الفيزيائية للمادة دون أن
يغير تركيبها.

أمثلة

تغيرات الحالة
تكسير الزجاج
إعادة تشكيل الألمنيوم

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني


صنف التغيرات الآتية إلى تغيرات كيميائية و فيزيائية :

((انفجار الألعاب النارية - صدأ الحديد - انصهار الجليد - تبخر الماء - احتراق الورقة -
احتراق السكر- فص ورقة على شكل دائرة - تقطيع البندورة - تخمر الحليب))



تغيرات كيميائية	تغيرات فيزيائية
انفجار الألعاب النارية	انصهار الجليد
صدأ الحديد	تبخر الماء
احتراق الورقة	قص الورقة على شكل دائرة
احتراق السكر	تقطيع البندورة
تخمير الحليب	

الشكل الآتي يمثل تفاعل جزيئات الهيدروجين مع الكلور لإنتاج كلوريد الهيدروجين



• ما نوع الرابط الكيميائي بين ذرات H-H ؟ تساهمية أحادية




ذرتا الهيدروجين

جزيء الهيدروجين




• ما نوع الرابطة بين ذرات الكلور Cl-Cl ؟ تساهمية أحادية

جزيء الكلور (Cl₂)





Cl — Cl

رابطة تساهمية



ما نوع الرابطة الكيميائية بين ذرات HCl ؟ تساهمية أحادية

على موقع دبرني




جزيء HCl




- عرف المواد المتفاعلة ؟ هي المواد التي تتعرض للتفاعل الكيميائي.

- عرف المواد الناتجة ؟ هي المواد التي تنتج عن التفاعل الكيميائي.

** يمكن تمثيل تفاعل الأكسجين والهيدروجين بالمعادلة الآتية :



** يمكن تمثيل تفاعل الميثان مع الأكسجين بالمعادلة الآتية :




- عرف المعادلة الكيميائية ؟

هي طريقة للتعبير عن التفاعل الكيميائي توضح المواد المتفاعلة والناتجة وظروف التفاعل.

مواد متفاعلة

مواد ناتجة

كلوريد الكالسيوم $\xrightarrow{\text{كلور (غاز) + كالسيوم (صلب)}}$



لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على تلفونك

- عدد خطوات كتابة المعادلة الكيميائية ؟

- 1- تحديد عدد المواد المتفاعلة و المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي.
- 2- التعبير عن هذا التفاعل بكتابة معادلة لفظية بحيث تفصل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بسهم يوضع عليه ظروف التفاعل وإشارة (+) بين المواد عندما تكون أكثر من مادة.
- 3- كتابة الرموز والصيغ الدالة على المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وحالة كل منها بين قوسين.
- 4- وزن المعادلة لجعل عدد ذرات كل عنصر في طرفي المعادلة متساوياً وذلك بالضرب في معاملات عددية توضع قبل الرموز والصيغ.

** عند كتابة المعادلة الكيميائية نكتب الغازات على شكل جزيء مثل :

{ غاز الأكسجين (O_2) - غاز النتروجين (N_2) - غاز الهيدروجين (H_2) - غاز الكلور (Cl_2) }



الجدول التالي يوضح الرموز المستخدمة في المعادلات الكيميائية

الرمز	الغرض
+	يفصل بين مادتين أو أكثر من المتفاعلات أو النواتج.
→	يفصل المتفاعلات عن النواتج.
⇌	يفصل المتفاعلات عن النواتج ويشير إلى التفاعل المنعكس
(s)	يشير إلى الحالة الصلبة.
(l)	يشير إلى الحالة السائلة.
(g)	يشير إلى الحالة الغازية.
(aq)	يشير إلى المحلول المائي.

أنواع المعادلات الكيميائية


معادلات رمزية

معادلات لفظية

المعادلة اللفظية التالية :
كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
أكسيد المغنيسيوم على موقع دبرني الأكسجين + المغنيسيوم

أكسيد المغنيسيوم → الأكسجين + المغنيسيوم

معادلة لفظية





لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

$Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(aq)$

معادلة رمزية

شروط المعادلة الكيميائية الموزونة




1- قانون حفظ المادة : ينص على "تساوي أعداد الذرات و أنواعها في طرفي المعادلة "

2- قانون حفظ الشحنة الكهربائية :

ينص على "تساوي المجموع الجبري للشحنات في طرفي المعادلة "

**** في المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :**



نلاحظ أن :

- عدد ذرات الفضة **Ag** في طرفي المعادلة يساوي (2)
- عدد ذرات النيكل **Ni** في طرفي المعادلة يساوي (1)
- الشحنة الكهربائية في طرفي المعادلة تساوي (+2)

- اذكر نص قانون حفظ المادة ؟

المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي ولكنها تتغير من شكل إلى آخر .

- فسر قانون حفظ الكتلة (المادة) ؟

مجموع كتل المواد المتفاعلة = مجموع كتل المواد الناتجة

أي أن :

عدد ذرات كل عنصر ونوعها في المواد المتفاعلة يماثل عدد ذراته في المواد الناتجة

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي



التفاعل الكيميائي لا يؤدي إلى نقص أو زيادة في عدد الذرات المتفاعلة أو تغير في

نوعها فعدد الذرات ونوعها يبقى ثابتاً بعد انتهاء التفاعل

Google play



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

الشكل الآتي يمثل احتراق غاز الميثان لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء








Watermarkly


الشكل الآتي يمثل احتراق غاز الإيثان لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء



سؤال : وازن المعادلات الكيميائية الآتية



أنواع التفاعلات الكيميائية



تفاعل الاحتراق Combustion Reaction

- عرف تفاعل الاحتراق ؟ كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

هو تفاعل مادة ما (عنصر أو مركب) مع غاز الأكسجين ويصاحب التفاعل انطلاق طاقة في صورة حرارة أو ضوء



** المعادلة الآتية تمثل تفاعل احتراق قطعة من الفحم (فيها عنصر الكربون) :



- عدد بعض الأمثلة على تفاعلات الاحتراق ؟

- 1- احتراق الخشب
- 2- احتراق أنواع الوقود المختلفة

- علل عند حرق (100 g) من الفحم في كمية معلومة من غاز الأكسجين حرقاً تاماً ، فإن كمية الناتج تكون أقل من المتوقع ؟

بسبب ضياع جزء من التفاعل على شكل طاقة حرارية أو بخار الماء لم يتم ضبطه



- ما فائدة الحرارة الناتجة عن تفاعلات الاحتراق ؟

1- التدفئة

2- تحريك وسائل المواصلات

3- طهي الطعام

- **علل ان تفاعل احتراق الغذاء في الجسم مهم جداً ؟**

لأنه يزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية المتنوعة

- **عرف المركبات الهيدروكربونية ؟**

هي من المركبات العضوية تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين فقط

- ماذا ينتج عن تفاعل احتراق الهيدروكربونات ؟

ينتج عن احتراقها :

3- طاقة

2- بخار الماء

1- ثاني أكسيد الكربون


المعادلة الآتية تمثل احتراق البنزين لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء



تفاعل الاتحاد Combination Reaction

- **عرف تفاعل الاتحاد ؟** هو تفاعل يحدث بين مادتين أو أكثر لإنتاج مادة جديدة


**** المعادلة العامة التي تمثل تفاعل الاتحاد هي :**



**** المعادلة الآتية تمثل تفاعل اتحاد عنصر النحاس مع عنصر الكبريت لينتج مركب كبريتيد النحاس II**



**** المعادلة الآتية تمثل تفاعل أكسيد المغنيسيوم مع غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج كربونات المغنيسيوم**



**** المعادلة الآتية تمثل تفاعل برادة الحديد مع مسحوق الكبريت لإنتاج كبريتيد الحديد II**



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

تفاعل التحلل (التفكك) Decomposition Reactions



- عرف تفاعل التحلل ؟ لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

هو تفكك مركب واحد إلى مادتين أو أكثر باستخدام طاقة حرارية أو كهربائية أو ضوئية

- ما هي نواتج تفاعل التحلل ؟ عناصر أو مركبات

**** المعادلة العامة التي تمثل تفاعل التحلل هي :**



reactant

products



Watermarkly





تفاعل التحلل (التفكك) الحراري Thermal Decomposition Reactions

**** تحلل كربونات الفلز بالحرارة إلى أكسيد الفلز وغاز ثاني أكسيد الكربون :**

المعادلة العامة لتحلل كربونات الفلز


كربونات الفلز ← أكسيد الفلز + غاز ثاني أكسيد الكربون




**** المعادلة الآتية تمثل تحلل كربونات النحاس بالحرارة
منتجة أكسيد النحاس وغاز ثاني أكسيد الكربون**



**** المعادلة الآتية تمثل تحلل نترات الأمونيوم بالحرارة
منتجة أكسيد ثنائي النتروجين وبخار الماء**





**** المعادلة الآتية تمثل تحلل هيدروكسيد النحاس بالحرارة
منتجة أكسيد النحاس وبخار الماء**



** يتحلل أكسيد الزئبق بوجود الحرارة ، إلى عنصري الأكسجين و الزئبق :


حسب المعادلة الآتية :



** المعادلة الآتية تمثل تحلل دايكرومات الأمونيوم بالحرارة

منتجة أكسيد الكروم و غاز النتروجين و بخار الماء

حيث تسبب الغازات الناتجة فوراناً يشبه البركان



** يتحلل بروميد الفضة بوجود الضوء ، إلى عنصري الفضة و البروم:

حسب المعادلة الآتية :






- اذكر استخدامات بروميد الفضة ؟ يستخدم في طلاء الأفلام الفوتوغرافية



تعتمد بعض تفاعلات التحلل على استخدام التيار الكهربائي

** يتحلل الماء كهربائياً إلى عنصري الهيدروجين و الأكسجين :



تفاعلات الإحلال Displacement Reactions

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

- عرف تفاعل الإحلال ؟ هو تفاعل يحل فيه عنصر محل عنصر آخر في أحد مركباته

- ما الاسم الآخر لتفاعلات الإحلال ؟ تفاعل الاستبدال (الإزاحة) Replacement



- أين تحدث تفاعلات الإحلال ؟ تحدث غالباً في المحاليل المائية

تفاعلات الإزاحة (الإحلال)

تنقسم إلى

أولاً: تفاعل الإحلال الأحادي .

ثانياً: تفاعل الإحلال المزدوج .

تفاعل الإحلال الأحادي Single Displacement

- عرف تفاعل الإحلال الأحادي ؟

هو تفاعل يحل فيه عنصر نشط محل عنصر آخر أقل نشاطاً منه في أحد أملاحه

** المعادلة العامة لتفاعل الإحلال الأحادي



أولاً: تفاعلات الإحلال الأحادي (البسيط)

يتم التعرف على نشاط العناصر من خلال السلسلة الكهروكيميائية .

ماهي السلسلة الكهروكيميائية ؟

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي هي ترتيب تنازلي لجميع العناصر حسب نشاطها بالنسبة للهيدروجين .

عناصر أكثر نشاطاً من الهيدروجين و تحل محله

Li
K
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Cr
Fe
Co
Ni
Sn
Pb

H

Cu
Hg
Ag
Pt
Au

عناصر أقل نشاطاً من الهيدروجين ولا تحل محله

السلسلة الكهروكيميائية

ملاحظة

جميع العناصر تستطيع أن تحل محل الهيدروجين ماعدا (النحاس Cu ، الزئبق Hg ، الفضة Ag ، البلاتين Pt ، الذهب Au)

الشكل الآتي ؛ يبين سلسلة النشاط الكيميائي لبعض العناصر :

صوديوم Na مغنيسيوم Mg ألومنيوم Al خارصين Zn حديد Fe نيكل Ni الرصاص Pb نحاس Cu فضة Ag

الأقل نشاطًا

الأكثر نشاطًا



- ماذا يحدث عند وضع مسمار من الحديد في محلول كبريتات النحاس II ؟

عنصر الحديد يحل محل أيونات النحاس في المحلول


وينتج محلول كبريتات الحديد وتترسب ذرات النحاس

** المعادلة الآتية تمثل التفاعل السابق :



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني


هل يتفاعل الخارصين مع محلول كبريتات النحاس ؟



نعم

لماذا؟

لأن الخارصين (أنشط) من النحاس في سلسلة النشاط الكيميائي



- علل ترسب ذرات النيكل Ni عند وضع قطعة من عنصر الخارصين Zn في محلول كبريتات النيكل ؟
لأن الخارصين أنشط من النيكل في سلسلة النشاط الكيميائي




غمر شريط من النحاس في محلول مائي لنترات الفضة



ماذا يحدث للون المحلول ؟

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

يتغير إلى الأزرق



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

ما المادة المترسبة على شريط النحاس ؟

الفضة




هل يتفاعل النحاس مع محلول كبريتات الخارصين؟

لا

لماذا؟

لأن الخارصين (أنشط) يقع أعلى النحاس في سلسلة النشاط الكيميائي



الفلزات القليلة النشاط تكون خاملة لا تتفاعل لا تتآكل

الفلزات القليلة النشاط وهي الثمينة (Pd , Pt , Ag , Au) تسمى الفلزات النبيلة



لا تسمى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك



علل وجود الفلزات الثمينة

Pt , Ag , Au حرة في الطبيعة ؟

لأنها قليلة النشاط (خاملة) لا تتفاعل

** يحل الألمنيوم محل الرصاص في محلول نترات الرصاص ؛

ينتج محلول نترات الألمنيوم و ترسب ذرات الرصاص ؛ حسب المعادلة الآتية :



- ما الفرق بين تفاعل الاتحاد و تفاعل التحلل الحراري؟

تفاعل الاتحاد	تفاعل التحلل الحراري
هو تفاعل بين مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة جديدة	هو تحلل مادة واحدة لتنتج مادتين أو أكثر



مراجعة الدرس



السؤال الأول:

الفكرة الرئيسية: أوضح المقصود بكل من:

- **التفاعل الكيميائي:** هو تغير يطرأ على المواد يتضمن تكسير روابط وتكوين روابط جديدة ويؤدي إلى إعادة ترتيب الذرات بحيث تنتج مواد جديدة تختلف في صفاتها الفيزيائية والكيميائية عن المواد المتفاعلة

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

- **تفاعل الاحتراق:** هو تفاعل مادة ما (عنصر أو مركب) مع غاز الأكسجين ويصاحب التفاعل انطلاق طاقة في صورة حرارة أو ضوء



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

- **تفاعل الاتحاد:** هو تفاعل يحدث بين مادتين أو أكثر لإنتاج مادة جديدة
- **تفاعل التحلل الحراري:** هو تفكك مركب واحد إلى مادتين أو أكثر باستخدام طاقة حرارية

- **تفاعل الإحلال الأحادي:**

هو تفاعل يحل فيه عنصر نشط محل عنصر آخر أقل نشاطاً منه في أحد أملاحه

السؤال الثاني: أفسر قانون حفظ الكتلة.



مجموع كتل المواد المتفاعلة = مجموع كتل المواد الناتجة

أي أن:



عدد ذرات كل عنصر ونوعها في المواد المتفاعلة يماثل عدد ذراته في المواد الناتجة

السؤال الثالث: أزن المعادلات الكيميائية الآتية:

1



2






3




كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الرابع:

أصنف التفاعلات الآتية إلى أنواعها (وهي: الاتحاد، التحلل، الاحتراق، الإحلال الأحادي):



السؤال الخامس: أميز التفاعل الآتي الموضح في الشكل، وأفسره.



تفاعل الإحلال الأحادي:


حيث حل فيه العنصر النشط C

محل العنصر B الأقل نشاطاً منه في أحد أملاحه

السؤال السادس:



أفسر قانون حفظ الكتلة من خلال التفاعل الآتي:

عدد ذرات المواد المتفاعلة = عدد ذرات المواد الناتجة



نوع الذرات	عدد الذرات المتفاعلة	عدد الذرات الناتجة
الهيدروجين	4	4
الأكسجين	2	2

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني










سؤال
جواب



السؤال الأول:

يتحلل بروميد الفضة AgBr (المستخدم في طلاء الأفلام الفوتوغرافية) بتأثير الضوء إلى عناصره
اكتب معادلة موازنة لهذا التفاعل ؟

السؤال الثاني : أكمل المعادلات الآتية الممكنة الحدوث ؟ ثم سم المواد المتفاعلة والنتيجة ؟



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني




لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

**** تحلل كربونات الفلز الهيدروجينية بالحرارة إلى كربونات الفلز و الماء غاز ثاني أكسيد الكربون :**


كربونات الفلز الهيدروجينية $\xrightarrow{\Delta}$ كربونات الفلز + غاز ثاني أكسيد الكربون + بخار الماء

المعادلة العامة لتحلل كربونات الفلز الهيدروجينية

**** المعادلة الآتية تمثل تحلل كربونات الصوديوم الهيدروجينية بالحرارة**
منتجة كربونات الصوديوم و بخار الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون



بيكربونات الصوديوم



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الثالث :

اكتب معادلة موزونة تمثل تحلل كربونات المغنيسيوم الهيدروجينية $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ بالحرارة ؟



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

السؤال الرابع :

اكتب معادلة موزونة تمثل تحلل كربونات الخارصين ZnCO_3 بالحرارة ؟

السؤال الخامس :

ماذا يحدث عند غمس فلز الخارصين في محلول كبريتات النحاس ؟ مثل هذا التفاعل بمعادلة كيميائية ؟

اهم المفاهيم & المصطلحات

Mole	المول
Avogadro 's Number	عدد أفوجادرو
Molar Mass (M_r)	الكتلة المولية
Relative Atomic Mass (A_m)	الكتلة الذرية النسبية
Molecular Mass (M_m)	الكتلة الجزيئية
Formula Mass (F_m)	كتلة الصيغة

- عرف الذرة ؟

هي دقائق متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة وهي وحدة البناء والتركيب في العنصر

- مم تتألف الذرة ؟

1- نواة تحوي بروتونات ونيوترونات

2- إلكترونات تدور حول النواة



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



- كم تساوي كتلة كل من البروتون أو النيوترون ؟ تقريباً $1,67 \times 10^{-24}$ g

- كم تساوي كتلة الإلكترون ؟ كتلة الإلكترون تساوي $(1/1840)$ من كتلة البروتون

- علل لجأ العلماء إلى مقارنة كتل ذرات العناصر بالنسبة لبعضها ؟

لأن كتلة الذرة صغيرة جداً لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمجاهر ولصعوبة التعامل معها باستخدام أدوات القياس الشائعة

- ما الطريقة التي اعتمدها العلماء لقياس كتلة الذرة ؟
اعتمدوا قياس كتلة الذرة بالنسبة إلى كتلة ذرة معيارية

حيث أنهم :

استخدموا ذرة الكربون C التي تحتوي (6) بروتونات و (6) نيوترونات كذرة معيارية لقياس كتل الذرات الأخرى وكتلة هذه الذرة تساوي (12) وحدة سميت بـ (وحدة كتلة ذرية)

- كم تساوي وحدة كتلة ذرية (amu) لأي عنصر؟ تساوي $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون C

مهم :

** كتلة الذرة تعتمد على كتلة البروتونات والنيوترونات فيها
كتلة البروتون او النيوترون تساوي (1 amu) تقريباً

- علل من المتوقع أن تكون الكتلة الذرية للعنصر رقماً صحيحاً لكن في الواقع القيم المقاسة تحتوي عادة على كسور ؟ لوجود نظائر للعنصر لها كتل مختلفة

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

- عرف النظائر ؟ هي ذرات العنصر نفعله لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات.

مثل :



- عرف الكتلة الذرية النسبية (A_m) ؟ هي متوسط الكتل الذرية لنظائر ذرة عنصر ما

- ما وحدة قياس الكتلة الذرية النسبية ؟ amu ويمكن التعبير عنها بوحدة g

** العلاقة الرياضية التي تعبر عن الكتلة الذرية النسبية (RAM) :

$$\text{الكتلة الذرية النسبية } (A_m) = \frac{(\text{الكتلة الذرية للنظير 1} \times \text{نسبة توافره في الطبيعة}) + (\text{الكتلة الذرية للنظير 2} \times \text{نسبة توافره في الطبيعة})}{100}$$

$$A_m = A_{m1} \% + A_{m2} \%$$

سؤال

إذا علمت أن من نظائر عنصر الليثيوم في الطبيعة النظير ${}^6_3\text{Li}$

و أن كتلته الذرية = 6,02 بنسبة 7,5 % ؛ و النظير ${}^7_3\text{Li}$ كتلته الذرية 7,02 بنسبة 92,5 %

احسب الكتلة الذرية النسبية لعنصر الليثيوم ؟

$$A_m = A_{m1} \% + A_{m2} \%$$

$$= \left(\frac{7.5}{100} \times 6.02 \right) + \left(\frac{92.5}{100} \times 7.02 \right)$$

$$= 0.4515 + 6.4935 = 6.945 \text{ amu}$$

- عرف الكتلة الجزيئية (M_m) ؟

هي مجموع الكتل الذرية للذرات الموجودة في الجزيء الذي ترتبط ذراته بروابط تساهمية مقاسة بوحدة amu



- كيف يتم حساب الكتلة الجزيئية (M_m) لأي مركب ؟

- 1- تحديد نوع وعدد الذرات الداخلة في تركيب المركب
- 2- تحديد الكتلة الذرية لكل ذرة من الجدول الدوري
- 3- جمع الكتل الذرية لجميع العناصر التي يتكون منها

- احسب الكتلة الجزيئية (M_m) للماء (H_2O) إذا علمت أن :

الكتلة الذرية للهيدروجين تساوي (1) ، والكتلة الذرية للأكسجين تساوي (16) ؟

الكتلة الجزيئية (M_m) للماء =

$$\text{كتلة ذرة (H)} \times \text{عدد ذرات (H)} + \text{كتلة ذرة (O)} \times \text{عدد ذرات (O)}$$

$$M_m = (1 \times 2) + (16 \times 1) = 18 \text{ amu}$$

سؤال

- احسب الكتلة الجزيئية (M_m) لحمض النيتريك (HNO_3) إذا علمت أن :

الكتلة الذرية للهيدروجين تساوي (1) ، والكتلة الذرية للأكسجين تساوي (16) ،

والكتلة الذرية للنيتروجين تساوي (14) ؟

$$M_m = (A_{mH} \times 1) + (A_{mN} \times 1) + (A_{mO} \times 3)$$

$$M_m = (1 \times 1) + (14 \times 1) + (16 \times 3)$$

$$M_m = 1 + 14 + 48$$

$$M_m = 63 \text{ amu}$$

سؤال: احسب الكتلة الجزيئية (M_m) لكل من المواد الآتية :
مع العلم أن الكتل الذرية : { Na = 23 ، F= 19 ، Mg = 24 ، H = 1 ، CL = 35,5 }
{ Ca = 40 ، C = 12 ، N = 14 ، O = 16 ، S = 32

..... : H_2SO_4

..... : MgF_2

..... : $NaCl$

..... : $C_6H_{12}O_6$

..... : N_2

..... : MgO

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

..... : $CaCO_3$

- ما نوع الرابطة التي تربط الأيونات الموجبة والسالبة ؟ رابطة أيونية
لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك
عرف وحدة الصيغة الكيميائية ؟ هي الصيغة الكيميائية للمركب الأيوني

- عرف كتلة الصيغة (F_m) ؟ هي مجموع الكتل الذرية للعناصر في وحدة الصيغة للمركب الأيوني

- ما وحدة قياس كتلة الصيغة (F_m) ؟ amu

- كيف تحسب كتلة الصيغة (F_m) ؟

تحسب بنفس الطريقة المتبعة لحساب الكتلة الجزيئية النسبية

** احسب كتلة الصيغة للمركب $Al(NO_3)_3$ ؟

مع العلم أن الكتل الذرية : (Al = 27 ، N = 14 ، O = 16)

$$F_m = (27 \times 1) + (14 \times 3) + (16 \times 9)$$

$$F_m = 27 + 42 + 144 \Rightarrow F_m = 213 \text{ amu}$$



- عرف المول (mol) ؟ هو الوحدة الدولية المستخدمة في قياس كمية المادة

**** يمكن حساب عدد الجزيئات أو الذرات بالعلاقة الرياضية الآتية :**

عدد الجسيمات (أو الذرات) = عدد المولات $\times$ عدد أفوجادرو

$$N = N_A \times n$$

- لماذا سمي عدد أفوجادرو بهذا الاسم ؟ وما هو رمزه ؟ وما قيمته

سمي بهذا الاسم تكريماً للفيزيائي الإيطالي أفوجادرو ويرمز له بالرمز N_A ؛

*** قيمته :** $6,022 \times 10^{23}$ من الذرات أو الأيونات أو الجزيئات أو وحدات الصيغة

- عرف الكتلة المولية (M_r) ؟ هي كتلة المول الواحد من المادة

**** الكتلة المولية لأي جزيء تساوي في قيمتها الكتلة الجزيئية**

**** وحدة قياس الكتلة الجزيئية وحدة كتلة ذرية (amu)**

**** وحدة قياس الكتلة المولية (غ / مول) (g/mol)**

على موقع دبرني

عدد المولات = الكتلة بالغرام

الكتلة المولية

Google play

Download on the App Store

**** يتم حساب عدد المولات بالعلاقة الرياضية الآتية :**

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

**** بالرموز :**

$$n = \frac{m}{M_r}$$

السؤال الأول

احسب عدد مولات (n) الكربون التي تحتوي $3,01 \times 10^{23}$ ذرة ؟

$$N = N_A \times n$$

$$3,01 \times 10^{23} = 6,022 \times 10^{23} \times n$$

$$n = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,022 \times 10^{23}}$$

$$n = 0,5 \text{ mol}$$

السؤال الثاني

احسب عدد الجزيئات (N) الموجودة في (3 mol) من غاز الميثان CH_4 ؟

$$N = N_A \times n$$

$$N = 6,022 \times 10^{23} \times 3$$

$$N = 1,806 \times 10^{24} \text{ جزيء}$$



السؤال الثالث

احسب كتلة مول من جزيئات H_2O ؛

علماً بأن الكتلة الذرية لكل من $\text{H} = 1$ ، $\text{O} = 16$ ؟

الكتلة المولية لأي جزيء تساوي في قيمتها الكتلة الجزيئية ؛ لكنها تختلف في وحدة القياس

$$M_r = (A_{mH} \times 2) + (A_{mO} \times 1)$$

$$M_r = (1 \times 2) + (16 \times 1)$$


$$M_r = 2 + 16$$

$$M_r = 18 \text{ g/mol}$$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهية
على موقع دبرني

السؤال الرابع

احسب عدد ذرات عنصر البوتاسيوم (K) الموجودة في ($1 \times 10^3 \text{ mol}$) منه ؟



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

$$N = N_A \times n$$

$$N = 6,022 \times 10^{23} \times 1 \times 10^3$$

$$N = 6,022 \times 10^{24} \text{ ذرة}$$

السؤال الخامس

عينة من مركب ما كتلتها 4 g و الكتلة المولية M_r للمركب ؛ 40 g/mol ،

فما عدد المولات n ؟

$$n = \frac{m}{M_r}$$

$$n = \frac{4}{40}$$

$$n = 0,1 \text{ mol}$$



عرف العنصر ؟

هو مادة نقية بسيطة التركيب لا تتحلل إلى مواد أبسط منها بواسطة التفاعلات الكيميائية

- عرف المركب ؟ هو مادة نقية عددها كبير جداً وتتألف من اتحاد عنصرين أو أكثر.

مثل : ** NaCl

يتكون من ذرة صوديوم Na و ذرة كلور Cl



عرف الجزيء ؟

هو وحدة البناء والتركيب في المركبات وتمتلك صفات وخصائص المركب وكل جزيء يتكون من اتحاد ذرتين أو أكثر

(لا يشترط اختلاف الذرات وإنما عدد الذرات يكون أكثر من ذرتين).

((تختلف الجزيئات باختلاف الذرات المكونة لها))

مثل : ** الكلور Cl_2



يتكون من ذرتي أكسجين O_2



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

عرف الأيون ؟

هو ذرة تحمل شحنة موجبة أو سالبة نتيجة فقد أو كسب إلكترونات للوصول إلى حالة الاستقرار

- عرف الأيون الموجب ؟ هو ذرة فقدت الكترون من مستوى الطاقة الخارجي.

- عرف الأيون السالب ؟ هو ذرة اكتسبت الكترون (أي اضافة إلكترون إلى مستوى الطاقة الخارجي).

ما نوع الجسيمات في كل مما يأتي ؟

سؤال

Na ← ذرة

N_2 ← جزيء

K^+ ← أيون موجب

NaCl ← مركب (وحدة صيغة)



مراجعة الدرس



السؤال الأول: الفكرة الرئيسية: أوضح المقصود بكلّ من:

• **الكتلة الذرية النسبية (A_m):** هي متوسط الكتل الذرية لنظائر ذرة عنصر ما


• **الكتلة الجزيئية (M_m):**

هي مجموع الكتل الذرية للذرات الموجودة في الجزيء الذي ترتبط ذراته بروابط تساهمية مقبسة بوحدة amu

• **الكتلة المولية (M_r):** هي كتلة المول الواحد من المادة


كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي

• **كتلة الصيغة (F_m):** هي مجموع الكتل الذرية للعناصر في وحدة الصيغة للمركب الأيوني



• **المول (mol):** هو الوحدة الدولية المستخدمة في قياس كمية المادة


السؤال الثاني: أجد الكتلة المولية (M_r) لكل من C_2H_5OH , CH_4



$$M_r = (A_m C \times 1) + (A_m H \times 4)$$

$$M_r = (12 \times 1) + (1 \times 4)$$

$$M_r = 12 + 4 \Rightarrow M_r = 16 \text{ g/mol}$$



$$M_r = (A_m C \times 2) + (A_m H \times 6) + (A_m O \times 1)$$

$$M_r = (12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 1)$$

$$M_r = 24 + 6 + 16 \Rightarrow M_r = 46 \text{ g/mol}$$

السؤال الثالث: أجد كتلة الصيغة (F_m) للمركبين Ca(OH)_2 , $\text{Mg(NO}_3)_2$

Mg(OH)_2 $F_m = (24 \times 1) + (14 \times 2) + (16 \times 6)$

$F_m = 24 + 28 + 96 \Rightarrow F_m = 128 \text{ amu}$

Ca(OH)_2 $F_m = (40 \times 1) + (16 \times 2) + (1 \times 2)$

$F_m = 40 + 32 + 2 \Rightarrow F_m = 74 \text{ amu}$

السؤال الرابع:

أحسب عدد المولات (n) الموجودة في 72g من عنصر المغنيسيوم.

$n = \frac{m}{Mr}$

$n = \frac{72}{24}$

$n = 3 \text{ mol}$

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي على موقع دبرني

السؤال الخامس: أحيسب كتلة 0.1 mol من ذرات الألمنيوم.

$n = \frac{m}{Mr}$

$m = 0,1 \times 27$

$m = 2,7 \text{ g}$

السؤال السادس:

أحيسب عدد جزيئات NH_3 الموجودة في 2 مول منها.

$N = N_A \times n$

$N = 6,022 \times 10^{23} \times 2$

$N = 1,2 \times 10^{24} \text{ جزيء}$

السؤال السابع: أوضح المقصود بعدد أفوجادرو.

هو $6,022 \times 10^{23}$ من الذرات أو الأيونات أو الجزيئات أو وحدات الصيغة

السؤال الثامن: أكمل الجدول الآتي: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

H_2	Cl_2	HCl	
1	1	2	عدد المولات
عدد أفوجادرو	عدد أفوجادرو	عدد أفوجادرو	عدد الجزيئات
2 g/mol	71 g/mol	36.5 g/mol	الكتلة المولية



سؤال & جواب

السؤال الأول: ما عدد مولات كربونات المغنيسيوم $MgCO_3$ في عينة كتلتها g (252) منه مع العلم أن { $O = 16$ ، $C = 12$ ، $Mg = 24$ }

السؤال الثاني : احسب الكتلة المولية لكل من المركبات الآتية ؟
مع العلم أن الكتل الذرية :

{ Ca = 40 ، C = 12 ، N = 14 ، O = 16 ، K = 39 ، H = 1 }

: NH₃

: C₂H₆

: N₂


: Ca(OH)₂

: KOH

: CH₄



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

السؤال الثالث : ما عدد مولات كربونات الكالسيوم CaCO₃ في عينة كتلتها g (400) منه
مع العلم أن الكتل الذرية { O = 16 ، C = 12 ، Ca = 40 }

السؤال الرابع : احسب كتلة mol (4) من CuBr_2 ؟
مع العلم أن الكتل الذرية { $\text{Br} = 80$ ، $\text{Cu} = 63,5$ }

السؤال الخامس : احسب كتلة mol (5) من CaCl_2 ؟
مع العلم أن الكتل الذرية { $\text{CL} = 35,5$ ، $40 = \text{Ca} = 40$ }



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



الدرس الثالث : الحسابات الكيميائية

لا تنسى تحميل تطبيق أهم المفاهيم & المصطلحات



Percentage Composition	النسبة المئوية بالكتلة
Mass Element	كتلة العنصر
Mass Compound	كتلة المركب
Empirical Formula	الصيغة الأولية
Molecular Formula	الصيغة الجزيئية
Percentage Yield	المردود المئوي
Mole Percentage	النسبة المولية
Actual Yield	المردود الفعلي (الحقيقي)
Predict Yield	المردود المتوقع (النظري)

عرف النسبة المئوية لكتلة العنصر ؟ هي نسبة كتلة العنصر في المركب إلى الكتلة الكلية للمركب

- كيف يتم حساب النسب المئوية لكتل العناصر في المركبات ؟
تحتسب بقسمة كتلة العنصر على كتلة المركب و ثم ضرب الناتج بـ (100%)

تعطى النسبة المئوية لكتلة العنصر بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$\text{النسبة المئوية لكتلة العنصر} = \frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{كتلة المركب}} \times 100 \%$$

**** بالرموز :**

$$\text{Percent Compisition} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

السؤال الأول

عينة نقية من مركب كبريتيد الحديد FeS II تكونت من تفاعل 6,4 g

من عنصر الحديد ؛ مع 3,2 g من عنصر الكبريت ، احسب النسبة المئوية بالكتلة لكل من العنصرين Fe و S في العينة ؟

• نحسب كتلة المركب كبريتيد الحديد FeS II :

$$m(\text{FeS}) = m(\text{Fe}) + m(\text{S})$$

$$m(\text{FeS}) = 6,4 + 3,2$$

$$m(\text{FeS}) = 9,6 \text{ g}$$

• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر Fe :

$$\text{Percent Compisition (Fe)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (Fe)} = \frac{6,4}{9,6} \times 100 \% = 67 \%$$

• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر S :

$$\text{Percent Compisition (S)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (S)} = \frac{3,2}{9,6} \times 100 \% = 33 \%$$

• إن مجموع النسب المئوية بالكتلة للعناصر المكونة للمركب تساوي 100 %

تعطى النسبة المئوية لكتلة العنصر أيضاً بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$\text{النسبة المئوية لكتلة العنصر} = \frac{\text{الكتلة الذرية للعنصر}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100 \%$$

** بالرموز :

$$\text{Percent Compisition} = \frac{A_m}{M_r} \times 100 \%$$



احسب النسبة المئوية لكل من عنصري الكربون و الهيدروجين

السؤال الثاني

في جزيء الجلوكوز الذي صيغته $C_6H_{12}O_6$ وكتلته المولية 180 g/mol مع العلم أن الكتل الذرية (C = 12 ، O = 16 ، H = 1) ؟

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{A_m}{M_r} \times 100 \%$$

$$C \% = \frac{72}{180} \times 100 \% = 40 \%$$

• النسبة المئوية للهيدروجين :

$$H \% = \frac{12}{180} \times 100 \% = 6,67 \%$$



السؤال الثالث

احسب النسبة المئوية بالكتلة لعنصر H في مركب كتلته 4,4 g و يحتوي 0,8 g منه

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{0,8}{4,4} \times 100 \% = 18,18 \%$$

السؤال الرابع

احسب النسبة المئوية لعنصر O في جزيء الجلوكوز الذي صيغته $C_6H_{12}O_6$ ؛

و كتلته المولية 180 g/mol مع العلم أن الكتل الذرية (C = 12 ، O = 16 ، H = 1) ؟

$$\text{Percent Compisition (O)} = \frac{A_m}{M_r} \times 100 \%$$

$$O \% = \frac{96}{180} \times 100 \% = 53 \%$$

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

سؤال & جواب

السؤال الأول : احسب النسبة المئوية الكتلية لكل من الكربون والأكسجين في CO_2 ؟
مع العلم أن الكتلة الذرية { C = 12 ، O = 16 }



السؤال الثاني : احسب النسبة المئوية الكتلية لكل من الهيدروجين والأكسجين في H_2O ؟
مع العلم أن الكتلة الذرية { $H = 1$ ، $O = 16$ }



السؤال الثالث : عند تحليل عينة نقية من مركب هيدروكربوني مجهول ، كتلتها $g(2,2)$ فكانت تحتوي $g(0,4)$ هيدروجين احسب النسبة المئوية لكل من الهيدروجين والكربون في العينة ؟



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

السؤال الرابع: عند تحليل عينة من مركب مجهول يتكون من البوتاسيوم والاكسجين فقط فإذا علمت أن كتلة البوتاسيوم في العينة $g(1,2)$ وكتلة الأكسجين في العينة $g(2,8)$ احسب النسبة المئوية بالكتلة للبوتاسيوم والأكسجين في المركب ؟

لعل تفيد الصيغة الكيميائية في التعبير عن عدد ذرات العناصر المكونة له ونوعها ؟
لأنه في الصيغة الكيميائية يظهر الرمز الكيميائي للعنصر وعدد ذراته

- عرف الصيغة الأولية ؟ هي أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات العناصر المكونة للمركب

- عدد خطوات كتابة الصيغة الأولية لمركب ما ؟

1- نكتب كتلة كل عنصر من العناصر المذكورة في السؤال أو النسبة المئوية لكل عنصر

2- نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية الآتية :



$$n = \frac{m}{Mr}$$

3- نجد أبسط نسبة عددية صحيحة

(نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الأول

ما الصيغة الأولية لمركب هيدروكربوني يحتوي (60 g) كربوناً و (20 g) هيدروجيناً
علماً بأن الكتل الذرية (C = 12, H = 1) ؟



لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك

الخطوات	C	H
نكتب كتلة كل عنصر من العناصر المذكورة في السؤال	60	20
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية	$\frac{60}{12} = 5$	$\frac{20}{1} = 20$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{5}{5} = 1$	$\frac{20}{5} = 4$

$$n = \frac{m}{Mr}$$

حيث أن النسبة بين ذرات C : H هي 1 : 4 عل الترتيب فالصيغة الأولية هي CH₄

السؤال الثاني

ما الصيغة الأولية لمركب يتكون من 40 % من الكالسيوم ، 12 % من الكربون ، 48 % من الأكسجين علماً بأن الكتل الذرية ($C = 12$ ، $O = 16$ ، $Ca = 40$) ؟

الخطوات	Ca	C	O
نكتب النسبة المئوية المذكورة في السؤال	40	12	48
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية $n = \frac{m}{Mr}$	$\frac{40}{40} = 1$	$\frac{12}{12} = 1$	$\frac{48}{16} = 3$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	1	1	3

فالصيغة الأولية هي $CaCO_3$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

- عرف الصيغة الجزيئية ؟ هي صيغة تبين الأعداد الفعلية للذرات و أنواعها في المركب



** يتم حساب الصيغة الجزيئية للمركب بالعلاقة الرياضية الآتية :

العدد الفعلي للذرات = عدد ذرات العنصر في الصيغة الأولية × الكتلة المولية للمركب
 كتلة الصيغة الأولية للمركب

** بالرموز :


$$N = N_{\text{emp}} \times \frac{Mr}{m_{\text{emp}}}$$



السؤال الأول

ما الصيغة الأولية و الصيغة الجزيئية لمركب هيدروكربوني يكون من 85,7 % من الكربون ،
14,3 % من الهيدروجين ، علماً بأن الكتل الذرية (H = 1 , C = 12) ؟

الخطوات	C	H
نكتب النسبة المئوية المذكورة في السؤال	85,7	14,3
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية $n = \frac{m}{Mr}$	$\frac{85,7}{12} = 7,1$	$\frac{14,3}{1} = 14,3$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{7,1}{7,1} = 1$	$\frac{14,3}{7,1} = 2$



فالصيغة الأولية هي CH_2

** يتم حساب الصيغة الجزيئية للمركب بالعلاقة الرياضية الآتية :

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي

$$N = \frac{Mr}{m \cdot emp} \times N_{emp}$$



$$N_C = \frac{1 \times 56}{14} = 4$$

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك


$$N_H = \frac{2 \times 56}{14} = 8$$

فالصيغة الجزيئية هي C_4H_8

لا تعجبك حلوة اللسان
فخلات الرصاص طعمها و مظهرها
قريب من السكر لكنها سم قاتل

السؤال الثاني

ما الصيغة الأولية و الصيغة الجزيئية لمركب كتلته المولية 58 g/mol و صيغته الأولية C_2H_5 ،
 علماً بأن الكتل الذرية ($H = 1$ ، $C = 12$) ؟



فالصيغة الأولية هي C_2H_5

** يتم حساب الصيغة الجزيئية للمركب بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$N = N_{emp} \times \frac{Mr}{m_{emp}}$$

$$N_C = 2 \times \frac{58}{29} = 4$$

$$N_H = 5 \times \frac{58}{29} = 10$$

فالصيغة الجزيئية هي C_4H_{10}

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
 على موقع دبرني

سؤال :

احسب الصيغة الجزيئية اذا علمت أن الصيغة الأولية لأحد أكاسيد النتروجين هي N_2O_5
 فإذا علمت أن الكتلة المولية للمركب تساوي (216 g/mol) مع العلم أن ($O = 16$ ، $N = 14$)

Google play

Download on the
 App Store

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

- علل تعد المعادلة الكيميائية الموزونة أساس الحسابات الكيميائية ؟

لأنها تدل على نسب عدد مولات المواد المتفاعلة والناجمة في التفاعل أي النسب الكمية للمواد المتفاعلة والناجمة

** خطوات استخدام المعادلات الكيميائية الموزونة في الحسابات الكيميائية :



- 1- يجب موازنة المعادلة الكيميائية
- 2- تحديد المادة المطلوبة (المجهولة) والمادة المعطاة بالسؤال (المعلومة)
- 3- تحديد عدد مولات كل من المادة المطلوبة والمادة المجهولة
العدد الموجود على يسار العنصر أو المركب الكيميائي هو **عدد المولات**
عند عدم وجود رقم نعتبره **مول واحد**
- 4- أسفل المعادلة الكيميائية الموزونة يجب تحديد سطرين
السطر الأول يتم حسابه باستخدام بعض القوانين
السطر الثاني يتم تعبئته من معطيات السؤال
- ** يجب أن تكون وحدات القياس للقيم الموجودة متطابقة بين السطرين
- 5- استخدام القانون الآتي

$$n = \frac{m}{Mr}$$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني


- عرف النسبة المولية (n . p) ؟ هي النسبة بين عدد مولات مادة إلى عدد مولات مادة أخرى



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

السؤال الأول

في المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :



احسب عدد مولات H_2O الناتجة من تفاعل 4 mol من O_2 مع كمية كافية من الهيدروجين ؟




1 mol 2 mol
4 mol **X mol**


$$X \text{ mol} = \frac{2 \times 4}{1} = 8 \text{ mol}$$

السؤال الثاني

في المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :



احسب كتلة H_2 اللازمة للتفاعل مع 7 mol من O_2 مع كمية كافية من الأكسجين ؛
علماً أن كتلة 1 mol من H_2 تساوي 2 g/mol ؟



$$m \text{ g} = \frac{7 \times 4}{1} = 28 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة H_2 في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{Mr} \rightarrow m = 2 \times 2 \rightarrow m = 4 \text{ g}$$


كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهية
على موقع دبرني

في المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :

السؤال الثالث



احسب كتلة Fe الناتجة من تفاعل 9 mol من الكربون C ؛ علماً أن كتلة المول : Fe = 56 g/mol



$$m \text{ g} = \frac{112 \times 9}{3} = 336 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة Fe في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{Mr} \rightarrow m = 2 \times 56 \rightarrow m = 112 \text{ g}$$

Watermarkly


السؤال الرابع

في لمعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :



احسب كتلة الأمونيا NH_3 الناتجة من تفاعل 56 g من النيتروجين ؛ علماً أن الكتل الذرية :

(H = 1 , N = 14)



$$m \text{ g} = \frac{34 \times 56}{28} = 68 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة N_2 في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{Mr} \longrightarrow m = 1 \times 28 \longrightarrow m = 28 \text{ g}$$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

** تم حساب كتلة NH_3 في السطر الأول :


$$n = \frac{m}{Mr} \longrightarrow m = 2 \times 17 \longrightarrow m = 34 \text{ g}$$

لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك



السؤال الخامس

في المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية :




1- احسب عدد مولات O_2 اللازمة للتفاعل مع 5 mol من عنصر المغنيسيوم ؟

2- احسب كتلة MgO الناتجة من احتراق 6 g من عنصر Mg احتراقاً تاماً



بوجود كمية كافية من الأكسجين ؟



الطلب الأول



$$X \text{ mol} = \frac{5 \times 1}{2} = 2,5 \text{ mol}$$



$$m \text{ g} = \frac{80 \times 6}{48} = 10 \text{ g}$$



** تم حساب كتلة Mg في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow m = 2 \times 24 \longrightarrow m = 48 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة MgO في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow m = 2 \times 40 \longrightarrow m = 80 \text{ g}$$

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

سؤال & جواب

السؤال الأول : ادرس التفاعل الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه ؟



ما عدد مولات كل من المواد الآتية ؟

..... : C_3H_8 **

..... : O_2 **

..... : CO_2 **

..... : H_2O **



السؤال الثاني : ينتج غاز الكلور وفقاً للتفاعل الكيميائي الآتي :



1- احسب كتلة HCl اللازمة للتفاعل مع (25 g) من MnO_2 ؟

2- احسب كتلة Cl_2 الناتجة من التفاعل ؟



السؤال الثالث : احسب كتلة NOCl الناتجة من تفاعل 7,1 g من Cl_2 ؛ حسب المعادلة الموزونة :



مع العلم أن : $\text{NOCl} = 65,5$, $\text{Cl}_2 = 71$ M_r g/ mol



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

السؤال الرابع : احسب كتلة Br_2 اللازمة للتفاعل مع كمية كافية من الهيدروجين لإنتاج 10 mol من HBr ؛ حسب المعادلة الموزونة :



مع العلم أن : $\text{H}_2 = 2$, $\text{Br}_2 = 160$ M_r g/ mol



- عرف المردود المئوي للتفاعل (Percentage Yield) ؟
هو النسبة المئوية للمردود الفعلي إلى المردود المتوقع للتفاعل
ويرمز له بـ (Y)

- عرف المردود المتوقع (النظري) (P_Y) ؟
هو أكبر كتلة يمكن الحصول عليها من استهلاك كتلة معلومة من إحدى المواد المتفاعلة

- عرف المردود الفعلي (الحقيقي) (A_Y) ؟ هو الكتلة التي نحصل عليها في المختبر أو الصناعة
- عدد العوامل التي جعلت الناتج الفعلي أقل من الناتج النظري (المردود المئوي أقل من 100%)

- 1- عدم اكتمال التفاعل
- 2- استعمال مواد متفاعلة غير نقية
- 3- فقدان جزء من الناتج عن طريق الترشيح أو نقله إلى وعاء آخر
- 4- خطأ في القياس

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

** يتم تمثيل المردود المئوي للتفاعل بالعلاقة الرياضية الآتية :

المردود المئوي = $\frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود المتوقع (النظري)}} \times 100\%$

$$Y = \frac{A_y}{P_y} \times 100 \%$$


- ما الفرق بين المردود الفعلي و المردود المتوقع للتفاعل ؟

المردود الفعلي	المردود المتوقع
هو كمية المادة الفعلية الناتجة من التفاعل التي يحصل عليها الكيميائي في المختبر أو الصناعة	هي كمية المادة الناتجة المحسوبة نظرياً

السؤال الأول

في تفاعل ما حصلنا على 2,64 g من كبريتات الأمونيوم ؛

فإذا علمت أن المردود المتوقع 3,3 g ، فاحسب المردود المئوي للتفاعل ؟



$$Y = \frac{A_y}{P_y} \times 100 \%$$

$$Y = \frac{2,64}{3,3} \times 100 \%$$

$$Y = 80 \%$$


في تفاعل ما حصلنا على 15 g من مادة ؛

فإذا علمت أن المردود المتوقع 25 g ، فاحسب المردود المئوي للتفاعل ؟

$$Y = \frac{A_y}{P_y} \times 100 \%$$

$$Y = \frac{15}{25} \times 100 \%$$

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك
 $Y = 60 \%$

مراجعة الدرس

السؤال الأول: **الفكرة الرئيسية:** ما أهمية الحسابات الكيميائية؟

1- تحديد كميات المواد المتفاعلة أو الناتجة بشكل دقيق

2- حساب مقدار ما يلزم من إحدى المواد المتفاعلة للتفاعل مع المادة الأخرى

3- الحصول على منتج نقي خال من الشوائب

السؤال الثاني: أوضّح المقصود بكلّ من:

- النسبة المئوية لكتلة العنصر: هي نسبة كتلة العنصر في المركب إلى الكتلة الكلية للمركب
- الصيغة الأولية: هي أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات العناصر المكونة للمركب
- الصيغة الجزيئية: هي صيغة تبين الأعداد الفعلية للذرات و أنواعها في المركب
- المردود المئوي للتفاعل: هو النسبة المئوية للمردود الفعلي إلى المردود المتوقع للتفاعل ويرمز له بـ (Y)

السؤال الثالث:

ما الصيغة الأولية لمركب يتكون من تفاعل 2.3g من الصوديوم Na مع 8g من البروم Br ؟

علماً بأن الكتل الذرية (Na = 23 , Br = 80)

الخطوات	Na	Br
نكتب كتلة كل عنصر من العناصر المذكورة في السؤال	2,3	8
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية	$\frac{2,3}{23} = 0,1$	$\frac{8}{80} = 0,1$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{0,1}{0,1} = 1$	$\frac{0,1}{0,1} = 1$

حيث أن النسبة بين ذرات Na : Br هي 1 : 1 عل الترتيب فالصيغة الأولية هي NaBr

لا تحسبن المجد تمرّاً أنت آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

السؤال الرابع:

ما الصيغة الجزيئية لمركب هيدروكربوني يتكون من 92.3% من الكربون، و 7.7% من الهيدروجين؛ علماً بأن الكتلة المولية للمركب 26 g/mol ؟

علماً بأن الكتل الذرية (H = 1 , C = 12)

الخطوات	C	H
نكتب النسبة المئوية المذكورة في السؤال	92,3	7,7
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية $n = \frac{m}{Mr}$	$\frac{92,3}{12} = 7,7$	$\frac{7,7}{1} = 7,7$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{7,7}{7,7} = 1$	$\frac{7,7}{7,7} = 1$



كل ملخص الصفوف الأساسية والتوجيهي
فالصيغة الأولية هي CH

** يتم حساب الصيغة الجزيئية للمركب بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$N = N_{emp} \times \frac{Mr}{m_{emp}}$$

$$N_C = 1 \times \frac{26}{13} = 2$$



$$N_H = 1 \times \frac{26}{13} = 2$$

فالصيغة الجزيئية هي C₂H₂

كن كسبائك الذهب الغالي
مهما صهرتهم لا يحترقون

السؤال الخامس:

أحسب كتلة أكسيد الحديد (III) Fe_2O_3 الناتجة من تفاعل 9.12g من كبريتات الحديد (II) FeSO_4 علمًا بأن معادلة التفاعل الموزونة هي:



$$m \text{ g} = \frac{160 \times 9,12}{304} = 4,8 \text{ g}$$



** تم حساب كتلة FeSO_4 في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \rightarrow m = 2 \times 152 \rightarrow m = 304 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة Fe_2O_3 في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \rightarrow m = 1 \times 160 \rightarrow m = 160 \text{ g}$$



خذ من الصوديوم الليونة

و من الفضة المعان


و من اليورانيوم إشعاع الودو المحبة

السؤال السادس:

أحسب عدد مولات غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 الناتجة من احتراق 6 mol من غاز الإيثان C_2H_6 احتراقاً تاماً في كمية وافرة من غاز الأكسجين. وذلك المعادلة الموزونة الآتية:




$$\text{X mol} = \frac{6 \times 4}{2} = 12 \text{ mol}$$



السؤال السابع:

أحسب المردود المئوي لتفاعل ما لإنتاج أكسيد الكالسيوم؛ علماً بأن المردود المتوقع 5.6g والمردود الفعلي 2.8g




$$Y = \frac{A_y}{P_y} \times 100\%$$

$$Y = \frac{2,8}{5,6} \times 100\%$$

$$Y = 50\%$$


الكيمياء هي نبض الحروف
هي المحلول المنظم لكل الحياة



سؤال & جواب

السؤال الأول :

احسب المردود المئوي لتفاعل ما لإنتاج أكسيد المغنيسيوم علماً بأن المردود المتوقع 3,2 g والمردود الفعلي 2,4 g ؟



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي

السؤال الثاني: املأ الجدول بما يناسبه على موقع دبرني

كلوريد الكالسيوم	 Google play  Download on the App Store	كبريتات الأمونيوم	اسم المركب
		لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك	
	Fe_2O_3	NaNO_3	صيغة المركب

السؤال الثالث : اذكر صيغ كل من الحموض الآتية ؟

- حمض الأستيك :
- حمض الهيدروكلويك :
- حمض الكبريتيك :



السؤال الرابع :

احسب عدد الجزيئات الموجودة في mol (2) من HCL
إذا علمت أن عدد أفوجادرو يساوي $(6,022 \times 10^{23})$ ؟

السؤال الخامس : ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (×) أمام العبارة الخاطئة:

- 1-) يدخل حمض الكبريتيك في صناعة الأسمدة
- 2-) محلول القواعد موصل للتيار الكهربائي.
- 3-) يؤثر حمض الكربونيك في ورقة تباع الشمس الحمراء.
- 4-) تشترك الحموض باحتوائها أيون الهيدروجين (H^+)
- 5-) صيغة كلوريد الأمونيوم هي : NH_4CL
- 6-) الكتلة المولية تساوي الكتلة الجزيئية النسبية
- 7-) انطلاق الغازات تدل على حدوث التفاعل الكيميائي
- 8-) كتلة الذرة صغيرة جداً
- 9-) صيغة الأمونيا هي (NH_4)
- 10-) تتميز الحموض بلمسها الصابوني
- 11-) صيغة الميثان هي (CH_4)

السؤال السادس : املأ الجدول بما يناسبه :

اسم المركب	كلوريد الحديد		كبريتات الكالسيوم
صيغة المركب		K_2O	Al_2O_3

السؤال السابع : احسب كتلة mol (4) مول من $CaCO_3$ مع العلم أن ($O = 16$ ، $Ca = 40$) ؟




مراجعة الوحدة



1. ما المقصود بكل من المصطلحات الكيميائية الآتية على موقع دبرني

• المول. • الكتلة الجزيئية. • التفاعل الكيميائي. • قانون حفظ الكتلة.

راجع الدوسية




• المردود المئوي للتفاعل. • النسب المئوية لكتلة عنصر في مركب لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تليفونك

2. أكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل:


أ. تفاعل عنصر الحديد الصلب مع غاز الأكسجين لإنتاج أكسيد الحديد (III) الصلب.



ب. تفاعل كربونات الكالسيوم الصلبة مع محلول حمض الهيدروكلوريك لإنتاج كلوريد الكالسيوم الصلب وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء السائل.



ج. تفاعل أيونات الفضة مع أيونات البروميد؛ لتكوين راسب من بروميد الفضة.



3. أستنتج الصيغة الأولية للمركب في كل من الحالات الآتية:

أ. تفاعل 2.3 g من الصوديوم مع 8 g من البروم.

ب. تفاعل 0.6 g من الكربون مع الأكسجين لتكوين 2.2 g من أكسيد الكربون.

الحالة (أ)

علماً بأن الكتل الذرية (Na = 23 , Br = 80)

الخطوات	Na	Br
نكتب كتلة كل عنصر من العناصر المذكورة في السؤال	2,3	8
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية	$\frac{2,3}{23} = 0,1$	$\frac{8}{80} = 0,1$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{0,1}{0,1} = 1$	$\frac{0,1}{0,1} = 1$

حيث أن النسبة بين ذرات Na : Br هي 1 : 1 على الترتيب فالصيغة الأولية هي NaBr

الحالة (ب)

علماً بأن الكتل الذرية (C = 12 , O = 16)

الخطوات	C	O
نكتب كتلة كل عنصر من العناصر المذكورة في السؤال	0,6	1,6
نحدد عدد مولات كل عنصر باستخدام العلاقة الرياضية	$\frac{0,6}{12} = 0,05$	$\frac{1,6}{16} = 0,1$
نجد أبسط نسبة عددية صحيحة (نقسم عدد مولات العنصر على القيمة الأقل لعدد المولات)	$\frac{0,05}{0,05} = 1$	$\frac{0,1}{0,05} = 2$

حيث أن النسبة بين ذرات C : O هي 1 : 2 على الترتيب فالصيغة الأولية هي CO₂

كتلة الأكسجين = 2.2 - 0.6 = 1.6 g

4. أستنتج الصيغة الجزيئية لمركب صيغته الأولية CH_2 وكتلته المولية 28 g .



** يتم حساب الصيغة الجزيئية للمركب بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$N = N_{\text{emp}} \times \frac{M_r}{m_{\text{emp}}}$$

$$N_C = 1 \times \frac{28}{14} = 2$$

$$N_H = 1 \times \frac{28}{14} = 2$$

فالصيغة الجزيئية هي C_2H_4

5. يحترق عنصر المغنسيوم وفق المعادلة الآتية:



أ . أحسب كتلة المغنسيوم اللازمة لإنتاج 8 g من أكسيد المغنسيوم.
ب. أحسب كتلة الأكسجين اللازمة لإنتاج 20 g من أكسيد المغنسيوم.

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

2Mg + O₂ → 2MgO

48 g 80 g 8 g

m g

المطلوب (أ)

$$m \text{ g} = \frac{48 \times 8}{80} = 4,8 \text{ g}$$


** تم حساب كتلة Mg في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \rightarrow m = 2 \times 24 \rightarrow m = 48 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة MgO في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \rightarrow m = 2 \times 40 \rightarrow m = 80 \text{ g}$$

الطلب (ب)



$$m \text{ g} = \frac{20 \times 32}{80} = 8 \text{ g}$$



** تم حساب كتلة O_2 في السطر الأول:

$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow m = 1 \times 32 \longrightarrow m = 32 \text{ g}$$

6. أحسب عدد المولات في: 9.8 g من حمض الكبريتيك H_2SO_4

$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow n = \frac{9.8}{98} \longrightarrow n = 0.1 \text{ mol}$$


$$M_r = (A_{mH} \times 2) + (A_{mS} \times 1) + (A_{mO} \times 4)$$

H_2SO_4

$$M_r = (1 \times 2) + (32 \times 1) + (16 \times 4)$$

$$M_r = 2 + 32 + 64 \longrightarrow M_r = 98 \text{ g/mol}$$

7. تتحلل كربونات الكالسيوم بالحرارة وفق المعادلة الآتية:




فإذا علمت أن الكتل الذرية: (C = 12, O = 16, Ca = 40)

أ. فأحسب كتلة أكسيد الكالسيوم الناتجة عن تسخين 50 g من كربونات الكالسيوم.
ب. وأحسب المردود المئوي للتفاعل إذا حصلنا على 15 g فقط من أكسيد الكالسيوم.



الطلب (أ)



$$m \text{ g} = \frac{56 \times 50}{100} = 28 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة CaCO_3 في السطر الأول :

$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow m = 1 \times 100 \longrightarrow m = 100 \text{ g}$$

** تم حساب كتلة CaO في السطر الأول :


$$n = \frac{m}{M_r} \longrightarrow m = 1 \times 56 \longrightarrow m = 56 \text{ g}$$

$$Y = \frac{A_y}{P_y} \times 100 \%$$

الطلب (ب)

$$Y = \frac{15}{28} \times 100 \%$$

$$Y = 54 \%$$




كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي

8. كربيد السيلكون SiC مادة قاسية تستخدم في صناعة ورق الزجاج وحجر الجلب، ويتم الحصول عليه من تسخين

أكسيد السيلكون مع الكربون وفق المعادلة:



لا تنسى تحميل تطبيق درسي على هاتفك



فإذا علم أن الكتل الذرية للعناصر المذكورة كالآتي: (C = 12, O = 16, Si = 28)


أ. فأزن معادلة التفاعل.

ب. أحسب عدد مولات CO الناتجة عن تفاعل 0.5 mol من SiO_2


ج. أحسب كتلة SiC الناتجة عن تفاعل 4 mol من ذرات الكربون.

د. أحسب النسبة المئوية لعنصر الكربون في المركب SiC .

الطلب (i)




الطلب (ب)



$$\text{X mol} = \frac{0,5 \times 2}{1} = 1 \text{ mol}$$

الطلب (ج)



$$\text{m g} = \frac{40 \times 4}{3} = 53,3 \text{ g}$$



** تم حساب كتلة SiC في السطر الأول :

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي

$$n = \frac{m}{M_r}$$

$$m = 1 \times 40$$

$$m = 40 \text{ g}$$






لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

$$\text{Percent Composition (C)} = \frac{A_m}{M_r} \times 100 \%$$

الطلب (د)

$$\text{C \%} = \frac{12}{40} \times 100 \% = 30 \%$$

9. أصنف المعادلات الآتية حسب أنواعها: (إلى اتحاد، أو تحليل، أو إحلال أحادي):



10. أختارُ رمزَ الإجابةِ الصحيحةِ في كلِّ ممَّا يأتي:

1. ما عددُ مولاتِ ذراتِ الأكسجينِ الموجودةِ في 1 mol من AgNO_3 ؟

- أ. 1 ب. 2 ج. 3 د. 4


2. أيُّ من الآتية يعدُّ الكتلة المولية لمركب Na_2SO_4 (بوحدة g/mol)؟

- أ. 71 ب. 119 ج. 142 د. 183

3. تُسمَّى كميةُ المادةِ الناتجةِ المحسوبةُ من التفاعل:

- أ. المردود المتوقع. ب. المردود الفعلي. ج. الكتلة المولية. د. المول.

11. **أميزُ** التفاعلاتِ الواردة في النماذج الآتية وأفسرُها:



c

احلال أحادي


استبدال ذرة محل ذرة
أخرى



b

تحلل

تحلل مادة واحدة لتنتج مادتين



a

اتحاد

تتحد مادتان لتنتج مادة واحدة

كن موصلاً جيداً للأخلاق الفاضلة و الصفات الحميدة
كن عاملاً حفازاً للخير
وانزيمياً مثبطاً للشر

12. مركب كتلته 8.8 g يتكون فقط من عنصري الكربون والهيدروجين، وكتلة الهيدروجين: 1.6 g

أ. **أحسب** النسبة المئوية بالكتلة لعنصري الكربون والهيدروجين في المركب.

ب. **أستنتج**: أي الصيغتين تمثل المركب C_2H_6 أم C_3H_8 ؟

الطلب (أ)

• نحسب كتلة الكربون :

$$m(\text{المركب}) = m(C) + m(H)$$

$$8,8 = m(C) + 1,6$$

$$m(C) = 8,8 - 1,6 = 7,2 \text{ g}$$

• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر C :

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{m. \text{ element}}{m. \text{ Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{7,2}{8,8} \times 100 \% = 81,8 \%$$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبربي

• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر H :

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{m. \text{ element}}{m. \text{ Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{1,6}{8,8} \times 100 \% = 18,2 \%$$

الطلب (ب)



$$F_m = (12 \times 2) + (1 \times 6)$$

$$F_m = 24 + 6 \Rightarrow F_m = 30 \text{ amu}$$



$$F_m = (12 \times 3) + (1 \times 8)$$

$$F_m = 36 + 8 \Rightarrow F_m = 44 \text{ amu}$$

• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر C :

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{12}{30} \times 2 \times 100 \% = 24 \%$$



• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر H :

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{1}{30} \times 6 \times 100 \% = 20 \%$$



• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر C :

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (C)} = \frac{12}{44} \times 3 \times 100 \% = 81,8 \%$$



• نحسب النسبة المئوية بالكتلة لكتلة عنصر H :

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{m . \text{element}}{m . \text{Compound}} \times 100 \%$$

$$\text{Percent Compisition (H)} = \frac{1}{44} \times 8 \times 100 \% = 18,2 \%$$

• الصيغة C3H8 هي التي تمثل المركب

اهم المفاهيم & المصطلحات

Energy	الطاقة
Enthalpy	المحتوى الحراري
Exothermic Reactions	تفاعلات طاردة للطاقة
Endothermic Reactions	تفاعلات ماصة للطاقة
Fusion	الانصهار
Evaporation	التبخّر
Freezing	التجمّد
Condensation	التكاثف
Sublimation	التسامي
Molar Fusion Energy	طاقة الانصهار المولية
Molar Evaporation Energy	طاقة التبخر المولية



لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على تلفونك

- عدد بعض الأشكال من التغيرات في الطاقة المرافقة للتفاعلات الكيميائية ؟
مع ذكر مثال على كل منها ؟

- 1- ضوئية : **مثل** (عملية البناء الضوئي)
- 2- كهربائية : **مثل** (التحليل الكهربائي ، المركم الرصاصي)
- 3- ضوئية : ← احتراق شريط المغنيسيوم
- 4- حرارية :

- كيف يتم انتقال الحرارة من المدفأة إلى الأشخاص المحيطين بها ؟ عن طريق الحمل و الإشعاع

- عرف التفاعلات الطاردة للطاقة ؟ هي تفاعلات كيميائية يصاحب حدوثها انطلاقاً (انبعاث) للطاقة

- عرف التفاعلات الماصة للطاقة ؟ هي تفاعلات كيميائية يصاحب حدوثها امتصاص طاقة



- عدد بعض الأمثلة على تفاعلات طاردة للطاقة ؟

- 1- احتراق الوقود (غاز الطبخ ، الفحم)
- 2- احتراق سكر الجلوكوز في الخلايا
- 3- تفاعلات التعادل بين الحموض و القواعد
- 4- تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك
- 5- تفاعل الثيرمايت الذي يستخدم في لحام السكك الحديدية



- اذكر بعض الأمثلة على تفاعلات ماصة للطاقة ؟

- 1- طهي الطعام
- 2- تفاعلات البناء الضوئي
- 3- تفاعلات التحلل ؛ كتحلل كربونات الكالسيوم CaCO_3

- عرف المحتوى الحراري (H) ؟ هو كمية الطاقة المخزونة في مول واحد من المادة




- عرف التغير في المحتوى الحراري (الإنثالبي) (ΔH) ؟ هو كمية الطاقة الممتصة أو المنبعثة خلال التفاعل


- متى يكون التفاعل ماص للطاقة ؟ يكون التفاعل ماص للطاقة عندما تكون إشارة ΔH موجبة (+)

- متى يكون التفاعل طارد للطاقة ؟ يكون التفاعل ماص للطاقة عندما تكون إشارة ΔH سالبة (-)

**** الشكل الآتي يبين مخطط تغير المحتوى الحراري للتفاعل :**




** يعتمد التغير في المحتوى الحراري (ΔH) على الحالة النهائية والحالة الابتدائية للتفاعل ولا يعتمد على الطريقة التي يحدث بها التفاعل :



مسار التفاعل الحراري :

ΔH موجبة وبالتالي التفاعل ماص للحرارة

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



مسار التفاعل الحراري

ΔH سالبة وبالتالي التفاعل طارد للحرارة

** يتم حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل بالعلاقة الرياضية الآتية :

التغير في المحتوى الحراري للتفاعل =
المحتوى الحراري للمواد الناتجة - المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة

**** بالرموز :**

$$\Delta H = H_{pr} - H_{re}$$

- ما دلالة كل رمز من الرموز الآتية :

ΔH ← **التغير في المحتوى الحراري**

H_{pr} ← **المحتوى الحراري للمواد الناتجة**
كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

H_{re} ← **المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة**
لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك

- **عدد مميزات التفاعلات الكيميائية الطاردة للطاقة الحرارية ؟**
1- يكون المحتوى الحراري للمواد الناتجة (H_{pr}) **أقل** من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة (H_{re})

2- تكون إشارة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH) **سالبة (-)**

3- تكتب قيمة الطاقة الناتجة في المعادلة الكيميائية الممثلة لها في جهة المواد الناتجة
وتسمى **معادلة كيميائية حرارية**

**** مثال : 1- احتراق الوقود**

2- تفاعلات التعادل بين الحمض والقاعدة

3- احتراق سكر الجلوكوز

- **أين تكتب قيمة الطاقة (الطاردة) في المعادلة الكيميائية ؟**

تكتب في جهة المواد الناتجة وتسمى معادلة كيميائية حرارية



**** يعد تفاعل شريط المغنيسيوم (Mg) مع حمض الهيدروكلوريك (HCl)**

تفاعل طارد للطاقة الحرارية



- عدد بعض الفوائد من الحرارة المنبعثة من التفاعلات الطاردة للطاقة ؟

- 1- طهي الطعام
- 2- التسخين
- 3- تشغيل المركبات وغيرها

كل ملفات المحتوى الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

- عدد مميزات التفاعلات الكيميائية الماصة للطاقة الحرارية ؟

- 1- يكون المحتوى الحراري للمواد الناتجة (H_{pr}) **أكبر** من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة (H_{re})



- 2- تكون إشارة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH) **موجبة (+)**

- 3- تكتب قيمة الطاقة الناتجة في المعادلة الكيميائية الممثلة لها في جهة المواد المتفاعلة

وتسمى معادلة كيميائية حرارية

**** مثال : 1- تفاعلات التحلل الحراري**

- 2- تفاعل البناء الضوئي

- 3- احتراق سكر الجلوكوز

- أين تكتب قيمة الطاقة (الماصة) في المعادلة الكيميائية ؟



تكتب في جهة المواد المتفاعلة وتسمى معادلة كيميائية حرارية



**** نلاحظ عند :**

إضافة كربونات الصوديوم الهيدروجينية (NaHCO_3) إلى محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl)
انخفاض درجة حرارة المحلول وهذا يعني أن التفاعل امتص الطاقة من المحلول

وتسبب في خفض درجة حرارة المحلول



- ما الفائدة من التفاعلات الطاردة للحرارة ؟

يستفاد منها في عمل الوجبات الساخنة من دون لهب كوجبات رواد الفضاء
كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

مهم :



وحدة قياس ΔH هي كيلو جول **KJ**
لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك
Download on the App Store
Google play

- يستخدم تفاعل الثيرمايت في لحام قضبان السكك الحديدية ؛ و يتطلب ذلك تزويده بكمية كبيرة من الحرارة لبدء التفاعل ، و رغم ذلك يعد تفاعل الثيرمايت طارداً للحرارة ؛ فسر ذلك ؟

لأن كمية الحرارة الناتجة من التفاعل أكبر بكثير من كمية الحرارة الممتصة اللازمة لبدء التفاعل


سؤال

1- أي التفاعلات الآتية يعدُّ ماصاً للطاقة، وأيها يعدُّ طارداً لها:



2- ماذا تمثل الطاقة في كلٍّ من التفاعلين السابقين؟ وما إشارتها؟

الطاقة في كل من التفاعلين تمثل التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ؛
يكون المحتوى الحراري **سالباً** في المعادلة الأولى
يكون المحتوى الحراري **موجباً** في التفاعل الثاني




تجربة

- ماذا يحدث لدرجة حرارة محلول حمض الهيدروكلوريك بعد تفاعله مع شريط المغنيسيوم ؟
ماذا تستنتج ؟

تزداد درجة حرارة المحلول ، أستنتج أن التفاعل طارد للحرارة
على موقع دبرني

- ماذا يحدث لدرجة حرارة محلول الماء بعد تفاعله مع كلوريد الأمونيوم ؟
ماذا تستنتج ؟



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك
تتخفض درجة حرارة المحلول ، أستنتج أن التفاعل ماص للحرارة


- ماذا يحدث لدرجة حرارة محلول حمض الهيدروكلوريك بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم ؟
ماذا تستنتج ؟

تزداد درجة حرارة المحلول ، أستنتج أن التفاعل طارد للحرارة

- فسر التغير الذي يحصل لدرجة الحرارة في كل حالة ؟




في الحالتين الأولى و الثالثة : تنتقل الحرارة من التفاعل إلى الوسط المحيط ؛
مما يسبب ارتفاعاً في درجة حرارة المحلول الناتج في الحالتين

أما في حالة إضافة كلوريد الأمونيوم إلى الماء ؛ تنخفض درجة حرارة المحلول بسبب أن التفاعل يحصل على الطاقة اللازمة لحدوثه من الماء ؛ أي أن الحرارة انتقلت من الوسط المحيط إلى التفاعل



سؤال وجواب

السؤال الأول: صنف التفاعلات الآتية إلى تفاعلات طاردة وماصة للطاقة الحرارية ؟




- عدد الحالات الفيزيائية التي تتواجد فيها المادة ؟

1- الحالة الصلبة 2- الحالة السائلة 3- الحالة الغازية

- ميز بين الحالات الفيزيائية للماء من حيث :

من حيث	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
الحجم	محدد	محدد	ليس له حجم محدد
الشكل	ثابت	يتغير الشكل بحسب الوعاء الذي توضع فيه	ليس له شكل ثابت
			

- عدد خصائص المادة في الحالة الصلبة ؟



- 1- لها شكل ثابت
- 2- لها حجم محدد
- 3- تترتب جسيمات المادة بشكل متراس
- 4- قوى التجاذب بين جسيماتها كبيرة
- 5- المسافات بين جسيماتها قليلة جداً
- 6- حركة الجسيمات اهتزازية



- اذكر بعض الأمثلة على مواد في الحالة الصلبة ؟

1- الكتاب

2- مكعب الثلج




كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهية
على موقع دبرني

- عدد خصائص المادة في الحالة السائلة ؟




لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

- 1- ليس لها شكل ثابت
- 2- لها حجم محدد
- 3- تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه
- 4- قوى التجاذب بين جسيماتها ضعيفة
- 5- المسافات بين جسيماتها كبيرة
- 6- تتحرك الجسيمات في اتجاهات مختلفة




- عدد خصائص المادة في الحالة الغازية ؟



- 1- ليس لها شكل ثابت
- 2- ليس لها حجم محدد
- 3- قوى التجاذب بين جسيماتها ضعيفة جداً
- 4- المسافات بين جسيماتها كبيرة جداً
- 5- جسيماتها قابلة للانضغاط
- 6- تتحرك جسيماتها حركة عشوائية وسريعة في جميع الاتجاهات
- 7- تملأ الحيز الذي توجد فيه وتتخذ شكله

- ماذا يحدث عند تسخين مكعب من الثلج ؟ وعند استمرار التسخين ؟



- 1- تكتسب جزيئاته طاقة
 - 2- تتحرك جزيئاته بسرعة أكبر
 - 3- تتباعد جزيئاته عن بعضها
 - 4- تقل قوى التجاذب بينها
- كل ملأات الثلج في الحالة السائلة على موقع دبرني

**** عند استمرار التسخين :**

- 1- تزداد حركة الجزيئات
 - 2- تتباعد الجزيئات أكثر عن بعضها
- تتحول إلى الحالة الغازية



- عرف الانصهار ؟

هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة

- عرف التجمد ؟

هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة معينة

- عرف التبخر ؟

هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينة

- عرف التكاثف ؟

هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة






- عرف التسامي ؟

هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة



- أي التحولات التالية ؛ يسبب انبعاثاً للطاقة الحرارية ؟ و أيها يتطلب امتصاصاً لها ؟



عملية الانصهار و التبخر ؛ و التسامي أيضاً يتطلب حدوثها تزويدها بكمية كافية من الحرارة ؛
بالتالي هي تفاعلات ماصة للحرارة

عملية التجمد و التكاثف ؛ يسبب حدوثهما انبعاثاً للحرارة ؛ بالتالي هي تفاعلات طاردة للحرارة

- علل تعد عملية الانصهار ماصة للطاقة ؟

لأنها عند تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تمتص طاقة حرارية كافية للتغلب على الترابط بين جزيئات المادة أو ذراتها

- علل نشعر ببرودة الجو في أيام الشتاء ؟

بسبب انصهار الثلج في أيام الشتاء ، حيث يمتص الجليد طاقة حرارية من الوسط المحيط ليتحول إلى الماء السائل

- عرف طاقة الانصهار المولية ؟

هي كمية الطاقة اللازمة لتحويل مول من المادة الصلبة عند درجة حرارة ثابتة إلى الحالة السائلة

** المعادلة الكيميائية الآتية تمثل عملية انصهار الجليد :



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

حيث تبلغ طاقة الانصهار المولية للجليد (6.01 KJ)



مهم : لكل مادة طاقة انصهار خاصة بها

- علل تعد عملية التبخر عملية ماصة للطاقة ؟

لأنه عند تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تتطلب كمية من الطاقة الحرارية لتحرير الجزيئات أو الذرات من قوى الترابط بينها في الحالة السائلة

- علل نشعر بالبرودة أو القشعريرة بعد الاستحمام ؟

بسبب تبخر الماء عن سطح الجسم مستمداً الطاقة الحرارية اللازمة لذلك من الجلد مما يخفض حرارة الجسم

- عرف طاقة التبخر المولية ؟

هي كمية الطاقة اللازمة لتبخير مول من المادة عند درجة حرارة معينة

****المعادلة الكيميائية الآتية تمثل عملية تبخر الماء:**



حيث تبلغ طاقة التبخر المولية للماء (40,7 KJ)

مهم : لكل مادة طاقة تبخر خاصة بها

- وضح أهمية عملية التبخر في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض و توزيع الحرارة عليه ؟

**** عند تبخر المياه من المسطحات المائية يحدث ما يلي :**

- 1- تمتص الحرارة من أشعة الشمس و الوسط المحيط
 - 2- تختزن الطاقة في بخار الماء ؛ فترتفع درجة حرارته و تقل كثافته
 - 3- يرتفع بخار الماء للأعلى ؛ و يتحرك مع الرياح
 - 4- يصل بخار الماء إلى طبقات الجو العليا الأقل حرارة
 - 5- يبرد بخار الماء و يتكاثف و يفقد تلك الطاقة
- ** بالتالي يتم نقل الطاقة و توزيع الحرارة من مكان إلى آخر**

عرف طاقة التكاثف المولية ؟

هي كمية الطاقة المنبعثة عند تكاثف مول من الغاز عند درجة حرارة معينة

طاقة التكاثف المولية = طاقة التبخر المولية

علل تعد عملية التجمد عملية طاردة للطاقة الحرارية ؟

لأنه عند تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تتطلب فقدان كمية من الطاقة للتقليل من حركة الجزيئات أو الذرات ويزيد من تجاذبها وتماسكها

عرف طاقة التجمد المولية ؟

هي كمية الطاقة الناتجة عن تجمد مول من المادة عند درجة حرارة معينة

طاقة التجمد المولية = طاقة الانصهار المولية

- اذكر مثال تفسر العبارة الآتية : طاقة التجمد المولية = طاقة الانصهار المولية ؟

يتجمد الماء ويتحول إلى جليد عند درجة صفر سلسيوس

وفي الوقت نفسه ينصهر الجليد

ويتحول إلى الماء السائل عند درجة الحرارة نفسها

فإذا تم تجميد مول من الماء وتحويله إلى جليد

تتطلق كمية من الطاقة تساوي (6,01 KJ) (طاقة التجمد المولية)

- علل تعد عملية التكاثف عملية طاردة للطاقة الحرارية ؟

لأنه عند تكاثف الغاز ويتحول إلى سائل يحتاج إلى زيادة الضغط المؤثر عليه وخفض درجة حرارته مما يسبب تقارب جزيئات الغاز من بعضها البعض حيث تسمح بتجاذبها وتحويلها إلى سائل

الشكل (6) تحولات الطاقة الخاصة بحالات الماء.

- بين كيف يحدث التسامي ؟ كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي على موقع دبرني

1- تكون المادة بالحالة الصلبة

2- تحتاج المادة طاقة كافية لتكسير الروابط بين جزيئاتها أو ذراتها

3- يصبح التجاذب بينها ضعيفاً جداً فتتحول إلى الحالة الغازية

- عرف طاقة التسامي المولية ؟



هي كمية الطاقة اللازمة لتحويل مول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية

- اذكر مثال يبين عملية التسامي ؟

تسامي مول من الجليد يتطلب تزويده بكمية من الطاقة تساوي (46.71 KJ)

وكمية الطاقة هذه تساوي

مجموع كمية الطاقة اللازمة في ما لو تم تحويله الحالة السائلة ثم الحالة الغازية



أي التحولات الفيزيائية التالية ؛ يرافقه انبعاث طاقة ، و أيها يرافقه امتصاص طاقة ؟

سؤال

* جفاف الملابس بعد غسلها ونشرها و تعريضها لأشعة الشمس :

تمتص جزيئات الماء المشربة داخل الملابس الطاقة الشمسية (الحرارية) ؛ مما يسبب تبخرها و مغادرتها للملابس و من ثم يسبب جفافها

* انصهار الكتل الجليدية أيام الربيع في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية :

عند سقوط أشعة الشمس على الكتل الجليدية ؛ فإنها تمتص الطاقة الشمسية (الحرارية) ، فيسبب انصهارها

* تكون الصقيع (الجليد) في ليالي الشتاء الباردة :

عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 0°C

1- تبرد اليابسة بسرعة أكبر من الماء الموجود عليها ؛ و تنخفض درجة حرارتها

2- يفقد الماء الحرارة بسرعة أقل ؛ و تبقى درجة حرارتها أعلى من اليابسة

3- تنتقل الحرارة من الماء إلى اليابسة

5- تنخفض درجة الحرارة إلى حد كاف للتجمد و تكون الصقيع

على موقع دبرني

مراجعة الدرس الأول
التفاعلات الكيميائية
تغيرات الطاقة في



لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على تلفونك

السؤال الأول: **الفكرة الرئيسية:** ما المقصود بكل مما يأتي:

• **المحتوى الحراري (H):** هو كمية الطاقة المخزونة في مول واحد من المادة

• **التفاعلات الطاردة للطاقة:** هي تفاعلات كيميائية يصاحب حدوثها انطلاقاً (انبعاث) للطاقة

• **التفاعلات الماصة للطاقة :** هي تفاعلات كيميائية يصاحب حدوثها امتصاص طاقة ؛ للتغلب على الروابط بين دقائق المواد المتفاعلة

• **طاقة التبخر المولية :** هي كمية الطاقة اللازمة لتبخير مول من المادة عند درجة حرارة معينة

• **طاقة التكاثف المولية :**

هي كمية الطاقة الممتصة عند تكاثف مول من الغاز عند درجة حرارة معينة

السؤال الثاني:

أحسب المتغيرات: إذا كان المحتوى الحراري للمواد الناتجة لتفاعل ما (120kJ)، وللمواد المتفاعلة (80kJ)، فكم يكون التغير في المحتوى الحراري للتفاعل؟ وما إشارته؟

$$\Delta H = H_{pr} - H_{re}$$

$$\Delta H = 120 - 80 \Rightarrow \Delta H = 40 \text{ KJ}$$

نكون إشارته موجبة

السؤال الثالث:


أفسر: التغير في المحتوى الحراري لبعض التفاعلات يكون سالباً (HΔ).

لأن المحتوى الحراري للمواد الناتجة أقل من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الرابع:

أصنف التفاعلات الماصة للحرارة والتفاعلات الطاردة لها:



ماص للحرارة.

السؤال الخامس: أفسر:

أ) الانخفاض النسبي لدرجة حرارة الهواء الملامس لسطح الأرض أثناء انصهار الثلج في أيام الشتاء.

لأن انصهار الجليد يتطلب امتصاص كمية من الطاقة يتم الحصول عليها من الوسط المحيط (اليابسة و الماء) ؛ مما يسبب انخفاضاً في درجة حرارة الجو و الهواء الملامس لسطح الأرض

ب) تُستخدم الكمادة الباردة للمساعدة على خفض حرارة الأطفال الذين يعانون من الحمى.

لأن تفاعل المادة المكونة للكمادة الباردة ؛ يتطلب امتصاصاً للطاقة الحرارية ، يتم الحصول عليها من جسم الطفل ، مما يسبب انخفاضاً في درجة حرارة الجسم

السؤال السادس:

أحسب المتغيرات: إذا كان المحتوى الحراري للمواد الناتجة عن تفاعل ما (140kJ)، والتغير في المحتوى الحراري للتفاعل (-60kJ)، فكم يكون المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة؟

$$\Delta H = H_{pr} - H_{re}$$
$$- 60 = 140 - H_{re} \Rightarrow H_{re} = 200 \text{ KJ}$$



الدرس الثاني : الطاقة الممتصة والمنبعثة من المادة
على موقع دبرني

اهم المفاهيم & المصطلحات

Heat Quantity	كمية الحرارة
Heat Capacity	السعة الحرارية
Specific Heat	الحرارة النوعية
Matter State	حالة المادة
Calorimetry	المسعر
Heat Absorbed	الحرارة الممتصة
Heat Emitted	الحرارة المنبعثة
Change in Temperature	التغير في درجة الحرارة
Land Breeze	نسيم البر
Sea Breeze	نسيم البحر

– **عرف كمية الحرارة ؟** هي مقدار الطاقة الحرارية المنقولة من جسم إلى آخر.

– **كيف تتبادل المواد المختلفة الحرارة مع الوسط المحيط ؟**
تنتقل الحرارة من المادة ذات درجة الحرارة العليا إلى المادة ذات درجة الحرارة الدنيا

– **علل عند وضع كأس من الماء تم تسخينه في الهواء لفترة معينة سوف تنخفض درجة حرارة الماء بداخله ؟**


لأنه فقد كمية من طاقته الحرارية وانتقلت إلى الوسط المحيط به (الهواء)

**** الشكل الآتي يوضح عملية تبادل الحرارة بين المادة و الوسط المحيط بها :**



– **اذكر مثال يبين أن تفاعل احتراق الوقود تفاعل طارد للطاقة الحرارية ؟**
تسخين كمية معينة من الماء باستخدام البرافين السائل (الكاز)

فالحارة الناتجة عن الاحتراق سوف تنتقل إلى الماء مسببة رفع درجة حرارته



– **كيف تختلف كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق ؟** تختلف باختلاف نوع الوقود المستخدم

– **عدد العوامل المؤثرة على قدرة المواد بامتصاص الحرارة ؟**

1- نوع المادة

2- طبيعة المادة

- عرف السعة الحرارية ؟

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلسيوس واحدة.

- عدد العوامل المؤثرة على السعة الحرارية ؟

- 1- كتلة المادة
- 2- مقدار التغير في درجة الحرارة

- ما وحدة قياس السعة الحرارية ؟ جول/س (J/°C)

- ما وحدة قياس كمية الحرارة ؟ جول (J)

** تعطى كمية الحرارة بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$q = C \cdot \Delta t$$

- ما دلالة كل من الرموز الآتية ؟

q ← كمية الحرارة الممتصة أو المنبعثة والتوجيهي

C ← السعة الحرارية للمادة

Δt ← التغير في درجة الحرارة

** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

- عرف الحرارة النوعية ؟

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة سلسيوس واحدة عند ضغط ثابت.

- ما وحدة قياس الحرارة النوعية ؟ جول/غ.س (J/g.°C)

** مهم :

- تختلف الحرارة النوعية من مادة إلى أخرى

- كلما قلت الحرارة النوعية للمادة فإنها تمتص كميات قليلة من الحرارة تؤدي إلى زيادة في درجة حرارتها

- علل يحتفظ الماء بمخزون كبير من الطاقة الحرارية عند تسخينه ؟ لأن حرارته النوعية كبيرة.

- علل عند تسخين وعاء من الحديد أو الألمنيوم يحتوي من الماء يلاحظ أن درجة حرارة الوعاء ارتفعت بدرجة أعلى بكثير من درجة حرارة الماء بداخله ؟

لأن الحرارة النوعية للمعادن بصفة عامة أقل بكثير من الحرارة النوعية للماء مما يجعلها تكتسب حرارة أكبر بكثير مما يكتسبه الماء



- علل تختلف الحرارة النوعية من مادة على أخرى ؟ بسبب اختلاف قوى ترابط ذرات المادة أو دقائقها معاً

- عرف المسعر ؟

هو وعاء معزول حرارياً يستخدم لقياس كمية الطاقة الممتصة أو المنبعثة من تفاعل كيميائي أو تحول فيزيائي




- عدد استخدامات المسعر ؟

- 1- قياس الحرارة النوعية للمادة
- 2- التغير في درجة حرارة الماء (تمثل التغير في درجة حرارة التفاعل)
- 3- قياس الحرارة الممتصة أو المنبعثة




- عدد بعض أنواع المسعر ؟ لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك

- 1- مسعر القنبلة
- 2- مسعر الماء
- 3- مسعر الثلج
- 4- مسعر التكثيف



- علل تبقى درجة حرارة جسم الإنسان السطحية ثابتة تقريباً (37°C) رغم تعرضه إلى تقلبات الحرارة اليومية؟

لأن (70 %) من كتلة الجسم تتكون من الماء ؛ و نظراً لارتفاع الحرارة النوعية للماء ، فإن تأثيره بالحرارة يكون قليلاً ، بالتالي فالجسم لا يتأثر بتغيرات الحرارة كباقي المواد



- **وضح كيفية حدوث نسيم البحر؟**

1- يحدث في النهار في أيام الصيف والربيع

2- يختلف تسخين أشعة الشمس لكل من ماء البحر واليابسة المجاورة

3- تكون الحرارة النوعية لليابسة أقل من الحرارة النوعية للماء

4- تمتص اليابسة كمية من الحرارة أكثر من التي يمتصها الماء


5- يسخن الهواء فوق اليابسة بسرعة أكبر من الهواء الموجود فوق الماء ويرتفع إلى الأعلى

6- ينخفض الضغط الجوي فوق اليابسة

7- يبقى الهواء فوق الماء أقل درجة حرارة ، و أكثر كثافة ، و أكثر ضغطاً

8- يندفع الهواء نحو اليابسة على شكل تيارات هوائية تسمى **نسيم البحر**

على موقع دبرني





- وضع كيف يحدث نسيم البر ؟

1- يحدث في الليل

2- الحرارة النوعية للماء كبيرة



3- يفقد الماء الحرارة ببطء أكثر من اليابسة التي تفقد الحرارة بسرعة أكبر

4- تبقى درجة حرارة الهواء فوق الماء أكبر من الهواء فوق اليابسة

5- يرتفع الهواء إلى أعلى

6- يقل الضغط الجوي فوق الماء

7- يندفع الهواء البارد من اليابسة نحو البحر على شكل تيارات هوائية باردة تسمى نسيم البحر



- علل تستطيع الفلزات على امتصاص الحرارة و توصيلها أكبر بكثير من قدرة الماء ؟
لأن الحرارة النوعية للفلزات أقل منها للماء

- ماذا يحدث عند تعريض كتلة من الماء وقطعة من الحديد أو الألمنيوم لهما الكتلة نفسها لأشعة الشمس لمدة محدودة ؟

نجد أن قطعة الحديد أو الألمنيوم ترتفع درجة حرارتها أضعاف ما ترتفع إليه كتلة الماء ،
وهذا يعني أنها تمتص كمية من الحرارة أكبر من تلك التي تمتصها كتلة الماء



- عدد العوامل المؤثرة على كمية الحرارة الممتصة ؟

1- الحرارة النوعية للمادة

2- التغير في درجة الحرارة :

عندما يتصل جسمان مختلفان في درجتي حرارتهما فإن كمية الحرارة تنتقل من أعلاهما درجة حرارة إلى الجسم الأدنى.

3- كتلة المادة :

كلما زادت كتلة الجسم زادت كمية الحرارة اللازمة لتسخينه.

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

** تعطى كمية الحرارة الممتصة أو المفقودة بالعلاقة الرياضية الآتية :



$$q = s \times m \times \Delta t$$

q : كمية الحرارة الممتصة أو المفقودة (J)

s : الحرارة النوعية للمادة $(J/g.^{\circ}C)$

m : كتلة المادة (g)

t_1 : درجة الحرارة الابتدائية $(^{\circ}C)$

t_2 : درجة الحرارة النهائية $(^{\circ}C)$

Δt : التغير في درجة الحرارة



السؤال الأول
تم تسخين (20 g) من الماء من (25 °C) إلى (30 °C) ؛
احسب كمية الحرارة التي امتصتها هذه الكتلة من الماء ؟

علماً أن الحرارة النوعية للماء تساوي (4, 18 J/g. °C)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 4,18 \times 20 \times 5 \Rightarrow q = 418 J$$

** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :

$$\Delta t = t_2 - t_1 \Rightarrow \Delta t = 30 - 25 = 5 ^\circ C$$

السؤال الثاني
تم تسخين قطعة من الحديد كتلتها (50 g) فارتفعت درجة حرارتها
من (25 °C) إلى (40 °C) ؛
احسب كمية الحرارة التي امتصتها هذه الكتلة من الحديد ؟

علماً أن الحرارة النوعية للحديد تساوي (0,45 J/g. °C)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 0,45 \times 50 \times 15 \Rightarrow q = 337,5 J$$

** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :

$$\Delta t = t_2 - t_1 \Rightarrow \Delta t = 40 - 25 = 15 ^\circ C$$

مهم :

** عند تبريد المادة وخفض درجة حرارتها فإنها ستفقد الطاقة الحرارية إلى الوسط المحيط

** تعتمد كمية الطاقة المنبعثة (المفقودة) على :

1- التغير في درجة حرارة المادة

2- كتلة المادة

كمية الحرارة الممتصة = - كمية الحرارة المنبعثة

وضعت قطعة من النحاس كتلتها (5 g) و درجة حرارتها (25 °C)

السؤال الثالث

في حوض ماء بارد ؛

فانخفضت درجة حرارتها إلى (15 °C) احسب كمية الحرارة المنبعثة هذه القطعة ؟

علماً أن الحرارة النوعية للنحاس تساوي (0,38 J/g. °C)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 0,38 \times 5 \times -10 \rightarrow q = -19 J$$

** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 15 - 25 = -10^\circ C$$

تم تعريض قطعة من الحديد كتلتها (50 g) ؛ درجة حرارتها (40 °C)

السؤال الرابع

إلى تيار هوائي بارد

فانخفضت درجة حرارتها إلى (25 °C) احسب كمية الحرارة المنبعثة هذه القطعة ؟

علماً أن الحرارة النوعية للحديد تساوي (0,45 J/g. °C)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 0,45 \times 50 \times -15 \rightarrow q = -337,5 J$$

** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 25 - 40 = -15^\circ C$$



قطعة من الألمنيوم كتلتها (150 g) ؛

السؤال الخامس

ما كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارتها (30 °C) ؟

علماً أن الحرارة النوعية للألمنيوم تساوي (0,89 J/g. °C)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 0,89 \times 150 \times 30 \rightarrow q = 4005 J$$

تم تعريض قطعة من الفضة كتلتها (50 g) ؛ درجة حرارتها (45 °C)

السؤال السادس

إلى تيار هوائي بارد

فانطلقت كمية من الحرارة مقدارها (240 J) فكم تكون درجة حرارتها النهائية ؟

علماً أن الحرارة النوعية للفضة تساوي (0,24 J/g. °C)


$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$-240 = 0,24 \times 50 \times \Delta t$$

إشارة q سالبة
لأنه يحدث تبريد
(انبعاث طاقة)

$$\Delta t = \frac{-240}{12}$$

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك



$$\Delta t = -20^{\circ}C$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow -20 = t_2 - 45$$

$$t_2 = 25^{\circ}C$$


- أيهما أكثر الحرارة النوعية للماء أم الفلزات ؟ الحرارة النوعية للماء أكبر

- كم تبلغ الحرارة النوعية للماء ؟ الحرارة النوعية للماء تساوي (4,18 J/g. °C)

علمتني الكيمياء أن الناجح

بكرر التجربة حتى يصل إلى مراده

قياس الحرارة النوعية للنحاس



** المواد و الأدوات اللازمة :

كأسان زجاجيان بسعة 300 ml ، كأس من البوليسترين ، ميزان حرارة كحولي ، ماسك معدني (ملقط) ، ميزان حساس ، ماء مقطر ، كرة نحاسية ، منصّب ، لهب بنسن

** خطوات العمل :

1. **أزن** الكرة النحاسية باستخدام الميزان الحساس، وأسجل كتلتها.
2. أضيف إلى الكأس الزجاجية (100ml) من الماء، وأضيف إليها الكرة النحاسية، وأضعها على اللهب أو السخان الكهربائي.
3. **أقيس**: أضيف إلى كأس البوليسترين (100ml) من الماء، وأضعها في الكأس الزجاجية الفارغة، وأقيس درجة حرارة الماء (t_1) وأسجلها.
4. **ألاحظ** غليان الماء في الكأس، وعند هذا أقيس درجة حرارة الكأس والكرة النحاسية (t_2)، وأسجلها.
5. أستخرج الكرة النحاسية من الماء باستخدام الملقط، وأضعها في كأس البوليسترين، وأسجل أعلى درجة حرارة يصل إليها الماء (t_3).
6. **ألاحظ**: هل ارتفعت درجة حرارة الماء بعد وضع الكرة النحاسية فيه؟ أم انخفضت؟
7. **أنظم** البيانات والقياسات في جدول.



** التحليل و الاستنتاج :

- 1- **أحدد** التغير في درجة حرارة الماء في كأس البوليسترين بعد إضافة الكرة النحاسية إليه. ماذا أستنتج؟
ترتفع درجة حرارة الماء بعد وضع الكرة النحاسية فيه ؛
أستنتج : أن الماء اكتسب الحرارة من الكرة النحاسية (المادة الأعلى درجة حرارة)
- 2- **أحدد** التغير في درجة حرارة الكرة النحاسية بعد وضعها في كأس البوليسترين؟ ماذا أستنتج؟
تنخفض درجة حرارة الكرة النحاسية بعد وضع الكرة النحاسية فيه ؛
أستنتج : أن الحرارة انتقلت من المادة الأعلى درجة حرارة إلى الوسط المحيط
(المادة الأدنى درجة حرارة)

3- أبين العلاقة بين كمية الحرارة في الحالتين السابقتين.

كمية الحرارة التي تفقدها الكرة النحاسية = كمية الحرارة التي يكتسبها الماء

4- استنتج الحرارة النوعية للنحاس.

$$q_{(H_2O)} = q_{Cu}$$

$$m_{(H_2O)} \times s_{(H_2O)} \times \Delta t_{(H_2O)} = m_{Cu} \times s_{Cu} \times \Delta t_{Cu}$$

$$100 \times 4.18 (t_3 - t_1) = m_{Cu} \times s_{Cu} (t_2 - t_3)$$


5- أقرن: أطبق النتيجة التي حصلت عليها مع القيمة المسجلة في الجدول، أفسر سبب الاختلاف إن وُجد.

- يتوقع أن تحصل نتيجة قريبة من المسجلة في الجدول ؛ (0, 38 J/g. °C)
- سبب الاختلاف بين القيمتين ؛ بسبب أخطاء القياس
- يتم تكرار التجربة أكثر من مرة ، ثم نأخذ المتوسط الحسابي للتقليل من أخطاء القياس

كل ملطات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



لا تنس تحميل تطبيق دبرني على الفونلا



السؤال الأول: الفكرة الرئيسية: ما المقصود بكل من:

- السعة الحرارية :
هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلسيوس واحدة.
- الحرارة النوعية ؟
هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة سلسيوس واحدة عند ضغط ثابت.

السؤال الثاني:

أفسر. عند تعرض الفلزات لأشعة الشمس في أيام الصيف الحارة ترتفع درجات حرارتها بشكل متفاوت.

بسبب اختلاف الحرارة النوعية لكل منها



السؤال الثالث:

أجيب عما يأتي:

(أ) **أحسب** كمية الحرارة الناتجة من تبريد (100g) ماء من (85°C) إلى (40°C).

(ب) **أحسب** كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة (100g) إيثانول من (15°C) إلى (35°C).

السؤال (أ)

كل ملفات المرفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

$$q = 4,18 \times 100 \times -45 \rightarrow q = -18810 J$$



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

**** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :**

$$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow \Delta t = 40 - 85 = -45^\circ C$$

السؤال (ب)

$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$q = 2,44 \times 100 \times 20 \rightarrow q = 4880 J$$

**** يتم حساب التغير في درجة الحرارة بالعلاقة الآتية :**

$$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow \Delta t = 35 - 15 = 20^\circ C$$

السؤال الرابع:

أحسب الحرارة النوعية لمادة الجرانيت، إذا امتصت قطعة منه كتلتها (200g) كمية من الحرارة مقدارها (3212J)؛ عند رفع درجة حرارتها بمقدار (20°C).



$$q = s \times m \times \Delta t$$

$$3212 = s \times 200 \times 20$$

$$s = \frac{3212}{4000}$$

$$s = 0,803 \text{ J/g.}^\circ\text{C}$$

السؤال الخامس:

أفكر: وضعت ثلاث صفائح متماثلة في الكتلة من النحاس، والألمنيوم، والحديد تحت أشعة الشمس في أحد أيام الصيف الحارة؛ بحيث تكتسب جميعها كمية الطاقة نفسها، ونقلت هذه الصفائح إلى ثلاثة مسعرات تحتوي كمية متماثلة من الماء عند درجة حرارة الغرفة؛ فأي هذه المسعرات تصبح درجة حرارة الماء فيه أكبر ما يمكن؟ أدمع إجابتي بالمبررات.

النحاس ؛ لأن الحرارة النوعية له أقل من كل من الحديد و الألمنيوم ، و تأثره بالحرارة أكثر

أي أنه يفقد كمية من الحرارة أكبر من الكمية التي يفقدها الحديد و الألمنيوم

مما يسبب ارتفاعاً أعلى في درجة حرارة الماء في المسعر

المادة	الحرارة النوعية (J/g.°C)
الألمنيوم	0.89
الحديد	0.45
النحاس	0.38

كن غصراً متعللاً في تعلمك
لا تكن ذي كهرسلبية فتستقرى على الضيف
و اصنع تكافؤاً في الحياة لتكن رقماً صعباً في المجتمع



السؤال الأول: تم تسخين (20 g) من الماء من (20 °C) إلى (40 °C) احسب كمية الحرارة التي امتصتها هذه الكتلة من الماء علماً أن الحرارة النوعية للماء تساوي (4.18 J/g. °C) ؟



السؤال الثاني : تم تسخين قطعة من الحديد كتلتها (60 g) فارتفعت درجة حرارتها من (15 °C) إلى (45 °C) احسب كمية الحرارة التي امتصتها هذه الكتلة من الحديد علماً أن الحرارة النوعية للحديد تساوي (0.45 J/g. °C) ؟



السؤال الثالث : وضعت قطعة من النحاس كتلتها (8 g) ودرجة حرارتها (20 °C) في حوض ماء بارد فانخفضت درجة حرارتها إلى (10 °C) احسب كمية الحرارة المنبعثة من هذه القطعة علماً أن الحرارة النوعية للنحاس تساوي (0.38 J/g. °C) ؟

اهم المفاهيم & المصطلحات

Energy Bond	طاقة الرابطة
Heat Reaction	حرارة التفاعل
Thermal Fuel Value	القيمة الحرارية للوقود
Energy Conservation Low	قانون حفظ الطاقة
Hess 's Low	قانون هيس
Standard Enthalpy of Formation	حرارة التكوين القياسية

- علل يلجأ الكيميائيون إلى استخدام طرائق ونظريات لحساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ؟

لاختلاف التفاعلات الكيميائية في آلية حدوثها وسرعتها وظروفها ومدتها الزمنية فيصعب قياس حرارة التفاعل بالمسعر والطرائق التقليدية

- عدد المراحل التي تمر فيها التفاعلات الكيميائية ؟

1- المرحلة الأولى :

يحدث فيها تكسير الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة حيث يتطلب اكتساب الذرات طاقة كافية لكسر الروابط بينها

2- المرحلة الثانية :

تحدث فيها إعادة ترتيب الذرات وتكوين روابط بينها في تراكيب كيميائية جديدة

- عرف طاقة الرابطة (BE) ؟


هي كمية الطاقة اللازمة لكسر مول من الروابط بين ذرتين في الحالة الغازية

- ما وحدة قياس طاقة الرابطة ؟ كيلو جول / مول (KJ/mol)

** يمكن استخدام طاقة الروابط في حساب التغير في المحتوى الحراري :

إن تفاعل احتراق غاز البروبان بوجود الأكسجين كما في المعادلة يمر بمرحلتين :





** المرحلة الأولى :

يتم فيها تكسير الروابط بين الذرات في المواد المتفاعلة

- 1- تتكسر الروابط بين ذرات الكربون والهيدروجين
- 2- تتكسر الروابط بين ذرات الكربون في البروبان (C_3H_8)
- 3- تتكسر الرابطة بين ذرتي الأكسجين في جزيء الأكسجين (O_2)



حيث تكتسب كل رابطة منها كمية من الطاقة لكسرها (العملية ماصة للطاقة)
 لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك

** المرحلة الثانية :

- 1- يتم تكوين روابط جديدة بين ذرات الكربون و الأكسجين في المركب (CO_2)
- 2- يتم تكوين روابط بين ذرات الأكسجين والهيدروجين في المركب (H_2O)
- 3- يرافق تكوين هذه الروابط انبعاش كمية من الطاقة (العملية طاردة للطاقة)

- علل إن تفاعل احتراق الوقود يكون عادة طارداً للطاقة ؟

لأن الطاقة المنبعثة نتيجة تكوين الروابط الجديدة أكبر من الطاقة اللازمة لتكسير الروابط في المواد المتفاعلة

عرف المركبات الهيدروكربونية؟

هي من المركبات العضوية تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين فقط

عرف الألكانات؟ مركبات هيدروكربونية مشبعة تحاط ذرة الكربون فيها بأربع روابط تساهمية أحادية

**** الجدول الآتي يبين كمية الطاقة المنبعثة من احتراق مول من بعض الألكانات :**

اسم الألكان	الصيغة الجزيئية للألكان	كمية الحرارة (KJ/mol)
ميثان	CH ₄	-882
إيثان	C ₂ H ₆	-1542
بروبان	C ₃ H ₈	-2202
بيوتان	C ₄ H ₁₀	-2877
بنتان	C ₅ H ₁₂	-3487
هكسان	C ₆ H ₁₄	-4141

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني

لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

**** كلما زادت عدد ذرات الكربون في الألكان تزداد كتلته المولية وبالتالي تزداد كمية الطاقة الناتجة عن احتراقها**

عرف القيمة الحرارية للوقود؟

هي كمية الحرارة الناتجة عن حرق غرام واحد من الوقود حرقاً تاماً بوجود الأكسجين

اذكر نص قانون حفظ الطاقة؟

إن مجموع الطاقة التي تمتصها الروابط في المواد المتفاعلة و التي تنبعث عند تكوين الروابط الجديدة يمثل التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH)

كمية الطاقة اللازمة لكسر الرابطة = - كمية الطاقة الناتجة عند تكوينها

- علل تكون الإشارة سالبة في طاقة الروابط في المواد الناتجة ؟
بسبب انبعاث الطاقة عند تكوين الرابطة

**** تبين العلاقة الآتية كيفية احتساب الحرارة المرافقة للتفاعل (ΔH) :**

$$\Delta H = \sum BE_{re} - \sum BE_{pr}$$

**** حيث أن :**

$\sum BE_{re}$: مجموع طاقة الروابط التي يتم تكسيرها في المواد المتفاعلة

$\sum BE_{pr}$: مجموع طاقة الروابط التي يتم تكوينها في المواد الناتجة

- عدد العوامل المؤثرة في طاقة الرابطة ؟
كل عامل يؤثر في الأساس والتوجيهي على موقع دبرني

1- طول الرابطة : كلما قل حجم الذرتين المرتبطتين ؛ قلت طول الرابطة ، و زادت طاقتها

2- عدد الروابط بين الذرتين (نوع الرابطة)



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

طاقة الرابطة الثلاثية < طاقة الرابطة الثنائية < طاقة الرابطة الأحادية



ادرس المعادلتين الآتيتين:

السؤال الأول



- أي الرابطتين تحتاج طاقة أعلى لكسرها ؛ الرابطة C-C أو C=C ؟



الرابطة C=C تحتاج طاقة أعلى لكسرها

- أي الرابطتين أقوى ؛ الرابطة C-C أو C=C ؟ فسر إجابتك ؟

الرابطة C=C أقوى ؛ لأنها تحتاج طاقة أعلى لكسرها

ادرس المعادلتين الآتيتين:

السؤال الثاني



- أي الرابطتين تحتاج طاقة أعلى لكسرها ؛ الرابطة $N=N$ أو $N\equiv N$ ؟

الرابطة $N\equiv N$ تحتاج طاقة أعلى لكسرها



- أي الرابطتين أقوى ؛ الرابطة $N=N$ أو $N\equiv N$ ؟ فسر إجابتك ؟

الرابطة $N\equiv N$ أقوى ؛ لأنها تحتاج طاقة أعلى لكسرها



ادرس المعادلتين الآتيتين:

السؤال الثالث



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



- ماذا تمثل الطاقة في المعادلة الأولى ؟ الطاقة اللازمة لكسر الرابطة C-H
لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

- ماذا تمثل الطاقة في المعادلة الثانية ؟ الطاقة الناتجة عن تكوين الرابطة C-H

- أي العمليتين ماص للطاقة ؛ و أيها طارد للطاقة ؟

العملية الأولى ماصة للطاقة ، و الثانية طاردة للطاقة

- ما العلاقة بين مقدار الطاقة اللازمة لكسر الرابطة بين ذرتين و الطاقة الناتجة عن تكون الرابطة بينهما ؟

مقدار الطاقة اللازمة لكسر الرابطة بين ذرتين تساوي مقدار الطاقة الناتجة عن تكون الرابطة بينهما

أيهما ينتج طاقة أكبر تكون الرابطة H-F أم تكون الرابطة H-I ؟

إذا علمت أن طاقة الرابطة H-F تساوي (565 KJ/mol) و طاقة الرابطة

H-I تساوي (297 KJ/mol) ؟

طاقة الرابطة H-F أكبر من طاقة الرابطة H-I ؛

لأن طول الرابطة H-F أقل من طول الرابطة H-I ،

و ذلك لأن حجم ذرة الفلور أصغر من حجم ذرة اليود

مهم :

طاقة الرابطة الثلاثية < طاقة الرابطة الثنائية < طاقة الرابطة الأحادية

يكون التفاعل **ماص للطاقة (للحرارة)** عندما تكون إشارة ΔH موجبة (+)

يكون التفاعل **طاردا للطاقة (للحرارة)** عندما تكون إشارة ΔH سالبة (-)

في التفاعلات الماصة للطاقة :



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على هاتفك

تكون الطاقة اللازمة لكسر الروابط أكبر من الطاقة الناتجة عن تكوين الروابط

في التفاعلات الطاردة للطاقة :


تكون الطاقة الناتجة عن تكوين الروابط أكبر من الطاقة اللازمة لكسر الروابط

وحدة قياس الحرارة المرافقة للتفاعل (حرارة التفاعل الكيميائي) ΔH هي كيلو جول (KJ)

لا تكن حديداً فتصدأ
ولا تكن نحاساً فتكسر

السؤال الخامس

يتكون غاز كلوريد الهيدروجين حسب المعادلة الكيميائية التالية :



مع العلم أن : طاقة الرابطة H-H 436 KJ/mol

طاقة الرابطة Cl-Cl 242 KJ/mol

طاقة الرابطة H-Cl 431 KJ/mol ؛ احسب الحرارة المرافقة للتفاعل ؟

$$\Delta H = \Sigma BE_{re} - \Sigma BE_{pr}$$

$$\Delta H = 1 \times (H - H) + 1 \times (Cl - Cl) - 2 \times (H - Cl)$$

$$\Delta H = 1 \times (436) + 1 \times (242) - 2 \times (431)$$

$$\Delta H = 436 + 242 - 862$$

$$\Delta H = -184 \text{ KJ}$$

إشارة ΔH سالبة (-) ؛ التفاعل طارد للطاقة (الحرارة)



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

يتفاعل النتروجين مع الأكسجين مكوناً أكسيد النيتروجين

السؤال السادس



حسب المعادلة الكيميائية التالية :

مع العلم أن :

طاقة الرابطة O=O 494 KJ/mol

طاقة الرابطة $\text{N} \equiv \text{N}$ 942 KJ/mol

طاقة الرابطة N=O 607 KJ/mol

طاقة الرابطة N-O 201 KJ/mol ؛

احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ؟

$$\Delta H = \Sigma BE_{re} - \Sigma BE_{pr}$$


$$\Delta H = 1 \times (N \equiv N) + 2 \times (O = O) - (2 \times (N = O) + 2 \times (N - O))$$

$$\Delta H = 1 \times (942) + 2 \times (494) - (2 \times (607) + 2 \times (201))$$

$$\Delta H = 942 + 988 - (1214 + 402)$$


$$\Delta H = + 314 \text{ KJ}$$

إشارة ΔH موجبة (+) ؛ التفاعل ماص للطاقة (للحرارة)



السؤال السابع

تفاعل غاز الميثان مع الكلور لتكوين غاز كلوروميثان و غاز كلوريد الهيدروجين



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

مع العلم أن : طاقة الرابطة C-H = 413 KJ/mol

طاقة الرابطة Cl-Cl = 242 KJ/mol

طاقة الرابطة C-Cl = 327 KJ/mol ؛

طاقة الرابطة H-Cl = 431 KJ/mol ؛ احسب التغير في المستوى الحراري للتفاعل ؟

$$\Delta H = \Sigma BE_{re} - \Sigma BE_{pr}$$

$$\Delta H = 1 \times (C - H) + 1 \times (Cl - Cl) - (3 \times (C - H) + (C - Cl) + (H - Cl))$$

$$\Delta H = 4 \times (413) + 1 \times (242) - (3 \times (413) + 1 \times (327) + 1 \times (431))$$


$$\Delta H = 1652 + 242 - (1239 + 327 + 431)$$

$$\Delta H = - 103 \text{ KJ}$$

إشارة ΔH سالبة (-) ؛ التفاعل طارد للطاقة (للحرارة)

السؤال الثامن

تحلل الماء ؛ حسب المعادلة الكيميائية التالية :



مع العلم أن :

طاقة الرابطة $\text{H-H} = 436 \text{ KJ/mol}$ ، طاقة الرابطة $\text{O=O} = 494 \text{ KJ/mol}$

طاقة الرابطة $\text{O-H} = 464 \text{ KJ/mol}$ ؛ احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ؟

$$\Delta H = \Sigma BE_{re} - \Sigma BE_{pr}$$

$$\Delta H = 4 \times (\text{O} - \text{H}) - (2 \times (\text{H} - \text{H}) + 1 \times (\text{O} = \text{O}))$$

$$\Delta H = 4 \times (464) - (2 \times (436) + 1 \times (494))$$

$$\Delta H = 1856 - (872 + 494)$$

$$\Delta H = +490 \text{ KJ}$$

إشارة ΔH موجبة (+) ؛ التفاعل ماص للطاقة (للحرارة)

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

تحلل بروميد الهيدروجين ؛ حسب المعادلة الكيميائية التالية :

السؤال التاسع



مع العلم أن :

طاقة الرابطة $\text{H-H} = 436 \text{ KJ/mol}$ ، طاقة الرابطة $\text{Br-Br} = 190 \text{ KJ/mol}$

طاقة الرابطة $\text{H-Br} = 362 \text{ KJ/mol}$ ؛ احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ؟

$$\Delta H = \Sigma BE_{re} - \Sigma BE_{pr}$$

$$\Delta H = 2 \times (\text{H} - \text{Br}) - (1 \times (\text{H} - \text{H}) + 1 \times (\text{Br} - \text{Br}))$$

$$\Delta H = 2 \times (362) - (1 \times (436) + 1 \times (190))$$

$$\Delta H = 724 - (436 + 190)$$

$$\Delta H = +98 \text{ KJ}$$


إشارة ΔH موجبة (+) ؛ التفاعل ماص للطاقة (للحرارة)



سؤال وجواب



السؤال الأول: استخدم طاقات الروابط الواردة في الجدول التالي واحسب (ΔH) للتفاعل المبين أدناه ، ثم بين إذا كان التفاعل ماص أو طارد للطاقة ؟



الروابط التي تكسرت	الطاقة اللازمة لكسر الروابط	الروابط التي تكونت	الطاقة اللازمة لتكوين الروابط
H-C	413	C=O	745
C=C	602	H-O	464
O=O	494		
المجموع			




لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

السؤال الثاني: استخدم طاقات الروابط الواردة في الجدول التالي واحسب (ΔH) للتفاعل المبين أدناه ، ثم بين إذا كان التفاعل ماص أو طارد للطاقة ؟



الروابط التي تكسرت	الطاقة اللازمة لكسر الروابط	الروابط التي تكونت	الطاقة اللازمة لتكوين الروابط
H-I	295	H-H	436
		I-I	149
المجموع			

السؤال الثالث : استخدم طاقات الروابط الواردة في الجدول التالي واحسب (ΔH) للتفاعل المبين أدناه ، ثم بين إذا كان التفاعل ماص أو طارد للطاقة ؟



الروابط التي تكسرت	الطاقة اللازمة لكسر الروابط	الروابط التي تكونت	الطاقة اللازمة لتكوين الروابط
H-C	413	H-C	413
C-C	348	C-C	348
CL-CL	242	C-CL	327
		H-CL	431
المجموع			

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

- اذكر نص قانون هيس (الكيميائي جيرمان هنري هيس) ؟


التغير في المحتوى الحراري للتفاعل يعتمد على طبيعة المواد المتفاعلة والنواتجة وليس على مسار حدوث التفاعل




لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على هاتفك

السؤال الأول


يتفاعل الجرافيت (C) مع الأكسجين لتكوين أول أكسيد الكربون كما في المعادلة الآتية :



" عند إجراء التفاعل فإنه يتكون خليط من أول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد الكربون (CO₂) ويمكن زيادة نسبة الأكسجين للحصول على ثاني أكسيد الكربون (CO₂) كما في المعادلتين الآتيتين :



$$\Delta H = - 393.5 \text{ kJ} \quad (1)$$



$$\Delta H = - 283 \text{ kJ} \quad (2)$$

بإستخدام المعادلتين (1 ، 2) احسب حرارة التفاعل ؟

*لحساب حرارة التفاعل نتبع الخطوات الآتية :

1- نعيد تنظيم التفاعلين لنحصل عند جمعهما على المعادلة النهائية للتفاعل

(الناتج النهائي يتضمن أول أكسيد الكربون (CO) كما في المعادلة الرئيسية)

2- نعكس المعادلة الثانية (حتى يظهر (CO) في المعادلة النهائية)


3- نعكس إشارة (ΔH) في المعادلة الثانية

4- نضرب المعادلة الثانية بالعدد (2) للتخلص من الكسر

5- تصبح المعادلة الثانية بالشكل الآتي :





6- نجمع المعادلتين (1 ، 3) :




7- نتخلص من المركب (CO_2) لعدم وجوده في المعادلة الرئيسية (احتراق الجرافيت)

8- نضرب المعادلة الأولى بالعدد (2) للتخلص من المركب (CO_2) ثم نجمع المعادلتين (1 ، 3)



**** المخطط الآتي يمثل التغير في المحتوى الحراري لتفاعل الكربون مع الأكسجين :**





السؤال الثاني

يتفاعل الأكسجين مع غاز كلوريد الهيدروجين؛ وفق المعادلة الآتية:



أستخدم المعادلتين الآتيتين لحساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل:





نعكس المعادلة الأولى ، لتصبح بالشكل التالي :



نضرب المعادلة (3) بـ (2) ، فنحصل على ما يلي :




نجمع المعادلتين (2 ، 4) ، فنحصل على ما يلي :




إشارة (ΔH) سالبة فالنتفاعل طارد للحرارة

السؤال الثالث

يتفاعل الألمنيوم (Al) مع أكسيد المنغنيز (MnO_2) وفق المعادلة الآتية:



أستخدم المعادلتين الآتيتين لحساب التغير في المحتوى الحراري للنتفاعل:






نضرب المعادلة (1) بـ (2) ، فنحصل على ما يلي :



نعكس المعادلة (2) ، ثم نضربها بـ (3) ، لتصبح بالشكل التالي :



نجمع المعادلتين (2 ، 4) ، فنحصل على ما يلي :



إشارة (ΔH)
سالبة فالنتفاعل
طارد للحرارة

- عرف حرارة التكوين القياسية ΔH_f° ؟

هي التغير في المحتوى الحراري الناتج عن تكوين مول واحد من المركب من عناصره الأساسية

- عدد الظروف القياسية التي يتم فيها قياس التغير في المحتوى الحراري ؟



1- التركيز (1 mol/L)

2- درجة الحرارة (25 °C)

3- الضغط (1 atm)

- بماذا تستخدم حرارة التكوين القياسية ؟ تستخدم في حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل

** في الظروف القياسية يتفاعل نصف مول من غاز الأكسجين (O_2) مع مول من غاز الهيدروجين (H_2) لتكوين مول من الماء السائل ويرافق ذلك انبعاث طاقة حرارية مقدارها (285,8 KJ \ mol) وهذه الطاقة تمثل حرارة التكوين القياسية للماء

المعادلة الآتية تمثل التفاعل الكيميائي :



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك



حرارة التكوين القياسية للمركبات الناتجة من التفاعل تكون ذات إشارة سالبة

حرارة التكوين القياسية للعناصر الحرة تساوي الصفر

** يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل باستخدام العلاقة الرياضية الآتية :



$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_{f(pr)}^\circ - \sum \Delta H_{f(re)}^\circ$$


ΔH° : التغير في المحتوى الحراري للتفاعل

$\Delta H_{f(pr)}^\circ$: حرارة التكوين القياسية للمركبات الناتجة

$\Delta H_{f(re)}^\circ$: حرارة التكوين القياسية للمركبات المتفاعلة

- عرف المعادلة الكيميائية الحرارية ؟ هي معادلة كيميائية تتضمن قيمة حرارة التفاعل

**** المعادلة الآتية تمثل احتراق مول من غاز الميثان بوجود الأكسجين منتجاً طاقة حرارية مقدارها (882 KJ) :**



**** يمكن استخدام المعادلة الكيميائية الحرارية لحساب كمية الحرارة المرافقة لاحتراق كتلة معينة من المادة أو تفاعلها**



*** الجدول التالي يمثل قيم حرارة التكوين القياسية لعدد من المركبات مقيسة بوحدة (كيلوجول/مول) :**

المادة	ΔH_f°	المادة	ΔH_f°	المادة	ΔH_f°
$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	-1669.8	$\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$	-103.8	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	-822.2
$\text{CaCO}_3(\text{s})$	-1207.0	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$	-277.6	$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$	-315.4
$\text{CaO}(\text{s})$	-653.5	$\text{H}_2\text{S}(\text{g})$	-20.1	$\text{NO}(\text{g})$	+90.4
$\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$	-986.6	$\text{HBr}(\text{g})$	-36.2	$\text{NO}_2(\text{g})$	+33.9
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	$\text{HCl}(\text{g})$	-92.3	$\text{NH}_3(\text{g})$	-46.1
$\text{CO}(\text{g})$	-110.5	$\text{HF}(\text{g})$	-268.6	$\text{SiO}_2(\text{s})$	-859.4
$\text{CH}_4(\text{g})$	-74.8	$\text{HI}(\text{g})$	+25.9	$\text{SO}_2(\text{g})$	-296.1
$\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$	+226.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	$\text{SO}_3(\text{g})$	-395.2
$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	+52.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.8	$\text{HNO}_3(\text{aq})$	-207.4
$\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	-84.7	$\text{H}_2\text{O}_2(\text{l})$	-187.6	$\text{CCl}_4(\text{l})$	-139

- علل تظهر قيم حرارة التكوين القياسية لبعض المركبات في الجدول بقيم موجبة ؟

لأن بعض المركبات مثل (NO_2) و (NO) ؛ تكون الطاقة اللازمة لتكسير الروابط بين ذراتها أكبر من الطاقة الناتجة عن تكوينها

احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي :

السؤال الأول



مع العلم أن حرارة التكوين للمركبات كالتالي :

$$\Delta H_f^\circ (\text{CH}_4) = -74.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ (\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ (\text{H}_2\text{O}) = -285.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_{f(\text{pr})}^\circ - \sum \Delta H_{f(\text{re})}^\circ$$

$$\Delta H^\circ = (\Delta H_f^\circ (\text{CO}_2) + 2 \Delta H_f^\circ (\text{H}_2\text{O})) - (\Delta H_f^\circ (\text{CH}_4) + 2\Delta H_f^\circ (\text{O}_2))$$

$$\Delta H^\circ = (-393.5 + 2 (-285.8)) - (-74.8 + 0)$$


$$\Delta H^\circ = (-393.5 - 571.6) + 74.8 = -890.3 \text{ kJ}$$

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي :

السؤال الثاني



باستخدام حرارة التكوين للمركبات :

$$\Delta H_f^\circ = \sum \Delta H_{f(\text{pr})}^\circ - \sum \Delta H_{f(\text{re})}^\circ$$


$$\Delta H_f^\circ = 4(\text{NH}_{3(g)}) - (4(\text{NO}_2) + 6(\text{H}_2\text{O}_{(g)}))$$

$$\Delta H_f^\circ = 4(-46.1) - (4(-207.4) + 6(-241.8))$$

$$\Delta H_f^\circ = -184.4 - (-829.6 - 1450.8) = -184.4 - (-2280.4) = +2096 \text{ kJ}$$

احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي :

السؤال الثالث




مع العلم أن حرارة التكوين للمركبات كالتالي :

$$\Delta H_f^\circ (\text{NO}_{2(g)}) = +33.9 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(l)}) = -285.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ (\text{HNO}_{3(aq)}) = -207.4 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ (\text{NO}_{(g)}) = +90.4 \text{ kJ/mol}$$




$$\Delta H_f^\circ = \sum \Delta H_f^\circ (\text{pr}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{re})$$

$$\Delta H_f^\circ = (3(\text{NO}_{2(g)}) + (\text{H}_2\text{O}_{(l)})) - (2(\text{HNO}_{3(aq)}) + (\text{NO}_{(g)}))$$

$$\Delta H_f^\circ = (3(+33.9) + (-285.8)) - (2(-207.4) + (+90.4))$$

$$= -184.1 - 324.4 = -508.5 \text{ kJ}$$

$$= -184.1 - 324.4 = -508.5 \text{ kJ}$$




لا تنسى تحميل تطبيق ديري على هاتفك

السؤال الرابع

استعواضة

يحترق الميثان بوجود الأكسجين؛ وفق المعادلة الحرارية الآتية:




فإذا احترق (128g) من الميثان بوجود كمية كافية من الأكسجين، فأحسب كمية الحرارة المرافقة للتفاعل؛ علماً بأن الكتلة المولية للميثان تساوي (16g/mol).

• نحسب عدد مولات الميثان CH_4 :

$$n = \frac{m}{Mr} \longrightarrow n = \frac{128}{16} \longrightarrow n = 8 \text{ mol}$$

• إشارة (ΔH) سالبة فالنتفاعل طارد للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :




$$q \text{ KJ} = \frac{882 \times 8}{1} = 7056 \text{ KJ}$$

السؤال الخامس

يُحضَّر أكسيد الكالسيوم CaO من تحليل كربونات الكالسيوم CaCO_3 بالحرارة؛ وفق المعادلة الحرارية الآتية:

كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي



أحسب كمية الحرارة اللازمة لتحليل (150g) من كربونات الكالسيوم بشكل كامل؛ علماً بأن الكتلة المولية لكربونات الكالسيوم تساوي (100g/mol).



• نحسب عدد مولات كربونات الكالسيوم CaCO_3 :

$$n = \frac{m}{Mr} \longrightarrow n = \frac{150}{100} \longrightarrow n = 1,5 \text{ mol}$$


• إشارة (ΔH) موجبة فالنتفاعل ماص للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :



$$q \text{ KJ} = \frac{178 \times 1,5}{1} = 267 \text{ KJ}$$

السؤال السادس

يُحضَّرُ أكسيد النيتروجين (NO) باحتراق الأمونيا بوجود الأكسجين؛ وفق المعادلة الحرارية الآتية:



أحسب كمية الحرارة الناتجة عند احتراق كمية كافية من الأمونيا لإنتاج (200g) من أكسيد النيتروجين (NO). علماً بأن الكتلة المولية لأكسيد النيتروجين (NO) تساوي (30g/mol).

• نحسب عدد مولات أكسيد النيتروجين NO :

$$n = \frac{m}{Mr} \quad \rightarrow \quad n = \frac{200}{30} \quad \rightarrow \quad n = 6,7 \text{ mol}$$


• إشارة (ΔH) سالبة فالفاعل طارد للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :



$$q \text{ KJ} = \frac{904,6 \times 6,7}{4} = 1515,21 \text{ KJ}$$

السؤال السابع

ايحترق الإيثانول السائل ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) بوجود الأكسجين؛ وفق المعادلة الحرارية الآتية:



فإذا احترق (30g) من الإيثانول بوجود كمية كافية من الأكسجين فأحسب كمية الحرارة المرافقة للفاعل. علماً بأن الكتلة المولية للإيثانول تساوي (46g/mol).

• نحسب عدد مولات الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$:

$$n = \frac{m}{M_r} \quad \longrightarrow \quad n = \frac{30}{46} \quad \longrightarrow \quad n = 0,65 \text{ mol}$$

• إشارة (ΔH) سالبة فالتفاعل طارد للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :




$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & 1368 \text{ KJ} \\ & \searrow & \nearrow \\ 0,65 \text{ mol} & & q \text{ KJ} \end{array}$$

$$q \text{ KJ} = \frac{1368 \times 0,65}{1} = 889,2 \text{ KJ}$$



السؤال الثامن

يتفاعل غاز الأمونيا مع الفلور؛ وفق المعادلة الآتية :



احسب كمية الحرارة الناتجة عن استهلاك (34 g)

من غاز الأمونيا، علماً بأن الكتلة المولية له تساوي



(17 g/mol). نحسب عدد مولات الأمونيا NH_3 :

$$n = \frac{m}{M_r} \quad \longrightarrow \quad n = \frac{34}{17} \quad \longrightarrow \quad n = 2 \text{ mol}$$

• إشارة (ΔH) سالبة فالتفاعل طارد للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & 881 \text{ KJ} \\ & \searrow & \nearrow \\ 2 \text{ mol} & & q \text{ KJ} \end{array}$$

$$q \text{ KJ} = \frac{881 \times 2}{1} = 1762 \text{ KJ}$$



مراجعة الدرس



السؤال الأول: الفكرة الرئيسية: ما المقصود بكلّ من:

• **طاقة الرابطة (BE):**

هي كمية الطاقة اللازمة لكسر مول من الروابط بين ذرتين في الحالة الغازية

• **حرارة التكوين القياسية ΔH_f° :**


هي التغير في المحتوى الحراري الناتج عن تكوين مول واحد من المركب من عناصره الأساسية

السؤال الثاني: أفسر. تعد تفاعلات احتراق الوقود طاردة للحرارة.

لأن الحرارة الناتجة عن تكوين الروابط بين ذرات المواد الناتجة أكبر من الحرارة اللازمة لتكسير الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة

السؤال الثالث:

أحسب حرارة التفاعل الآتي باستخدام جدول قيم الرابطة:



مع العلم أن :
 طاقة الرابطة $\text{O}=\text{O}$ = 494 KJ/mol ، طاقة الرابطة $\text{N} \equiv \text{N}$ = 942 KJ/mol
 طاقة الرابطة $\text{O}-\text{H}$ = 464 KJ/mol ، طاقة الرابطة $\text{N}-\text{H}$ = 386 KJ/mol

$$\Delta H = \sum BE_{re} - \sum BE_{pr}$$

$$\Delta H = 1 \times (\text{N} \equiv \text{N}) + 6 \times (\text{O} - \text{H}) - (6 \times (\text{N} - \text{H}) + \frac{3}{2} (\text{O} = \text{O}))$$

$$\Delta H = 1 \times (942) + 6 \times (464) - (6 \times (386) + \frac{3}{2} \times (494))$$


$$\Delta H = 942 + 2784 - (2316 + 741)$$

$$\Delta H = +699 \text{ KJ}$$

إشارة ΔH موجبة (+) ؛ التفاعل ماص للطاقة (للحرارة)

السؤال الرابع:

أحسب. باستخدام جدول قيم التكوين القياسية، أحسب حرارة تفاعل:



$$\Delta H_f^\circ = \sum \Delta H_f^\circ (\text{pr}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{re})$$

$$\Delta H_f^\circ = (\text{NO}_{(g)} + \text{CO}_{2(g)}) - (\text{NO}_{2(g)} + \text{CO}_{(g)})$$


$$\Delta H_f^\circ = 90.4 + (-393.5) - (33.9 + (-110.5))$$

$$\Delta H_f^\circ = -303.1 - 76.6 = -379.7 \text{ kJ}$$

السؤال الخامس:

أحسب. يُحضر سيانيد الهيدروجين (HCN) وفق المعادلة الآتية:

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي على موقع دبرني



إذا جرى إنتاج 20 غراماً من سيانيد الهيدروجين، فأحسب الطاقة المرافقة للتفاعل؛ علماً أن الكتلة المولية لـ (HCN) = 27g/mol

• نحسب عدد مولات سيانيد الهيدروجين HCN :

$$n = \frac{m}{Mr} \quad \longrightarrow \quad n = \frac{20}{27} \quad \longrightarrow \quad n = 0,74 \text{ mol}$$



$$2 \text{ mol} \quad \longrightarrow \quad 940 \text{ KJ}$$

$$0,74 \text{ mol} \quad \longrightarrow \quad \Delta H \text{ KJ}$$

إشارة (ΔH) سالبة
لأن التفاعل طارد
للحرارة


$$\Delta H \text{ KJ} = \frac{940 \times 0,74}{2} = - 347,8 \text{ KJ}$$



سؤال & جواب




السؤال الأول : إذا احترق (144 g) من الميثان بوجود كمية كافية من الأكسجين فاحسب كمية الحرارة المرافقة للتفاعل علماً بأن الكتلة المولية للميثان تساوي (16 g/mol)




كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الثاني : يحضر أكسيد الكالسيوم CaO من تحلل كربونات الكالسيوم CaCO_3 بالحرارة وفق المعادلة الآتية :



السؤال الثالث : يحضر الهيدروجين و الأكسجين بالتحليل الكهربائي للماء ، باستخدام أقطاب من البلاتين في محلول مائي ملحي مخفف ، وفق المعادلة الآتية :



احسب مقدار الطاقة اللازمة لتحليل 54 g من الماء علماً بأن الكتلة المولية له تساوي (18 g/mol)



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

السؤال الرابع : احسب كمية الطاقة الناتجة من تفاعل 560 g من النيتروجين N_2 وفق المعادلة الحرارية الآتية :



علماً بأن الكتلة المولية للنيتروجين تساوي (28 g/mol)


مراجعة الوحدة



1. أوضِّحْ المقصودَ بالمصطلحاتِ والمفاهيمِ الآتية:

- تغييرُ المحتوى الحراريّ.
- التفاعلُ الماصُّ للحرارة.
- طاقةُ التجمدِ المولية.
- طاقةُ التسامي المولية.
- الحرارة النوعية.
- حرارةُ التكوينِ القياسية.
- القيمةُ الحراريةُ للوقود.

راجع الدوسية




2. المخططُ المجاورُ يمثلُ تفاعلَ أكسيدِ الكالسيومِ معِ الماءِ لإنتاجِ هيدروكسيدِ

الكالسيوم، أدرسْ المخططَ وأجبْ عن الأسئلة الآتية:

أ. هل التفاعلُ ماصٌّ أم طاردٌ للحرارة؟

ب. أيُّهما أكثرُ الطاقةَ اللازمةَ لكسرِ الروابطِ في الموادِّ المتفاعلة؟ أم الطاقةُ

المنبعثةُ عندَ تكوينِ النواتجِ؟ حمل تطبيق دبرني على تلفونك



إشارة (ΔH) سالبة فالتفاعل طارد للحرارة

الطلب (أ)

التفاعل طارد للحرارة ، الأكثر طاقة هي الطاقة المنبعثة عند تكوين النواتج

الطلب (ب)





الحرارة الناتجة عن تكوين الروابط بين ذرات المواد الناتجة أكبر من الحرارة اللازمة

لتكسير الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة



الطلب (ج)

3. أدرس التفاعلات الآتية، وأجب عن الأسئلة الآتية:



أ. أحدد التفاعل الطارد للطاقة، والتفاعل الماص لها.



ب. أحدد أيها تكون قيمة (ΔH) لها إشارة سالبة.

ج. **أستنتج:** أيها يكون فيه المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة أكبر من المحتوى الحراري للمواد الناتجة.

د. **أرسم** مخططاً لكل من: تكوين المركب (NO_2) والمركب (NH_3) يبين التغير في المحتوى الحراري لكل منهما.



• التفاعلات الطاردة للطاقة

الطلب (أ)





كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي
على موقع دبرني

• التفاعلات الماصة للطاقة





إشارة (ΔH) سالبة فالتفاعل طارد للطاقة

الطلب (ب)



الطلب (ج)

في التفاعلات (1، 4)



4. أفسر ما يأتي:

أ. تعدُّ عملية التبخر تحولاً فيزيائياً ماصاً للطاقة، وعملية التجمد تحولاً فيزيائياً طارداً للطاقة.

لأنه عند تحول الماء السائل إلى بخار الماء يلزمه طاقة كافية للتغلب على الترابط بين جزيئات الماء السائل؛ فتتفصل عن بعضها على شكل جزيئات ماء حرة الحركة لا تجاذب بينها. أما عند تجمد الماء يتم تقارب جزيئات الماء السائل وانخفاض درجة حرارتها وتفق الطاقة وتقل طاقتها الحركية ويزداد التجاذب بين الجزيئات، ويزداد تماسكها، وتصبح مقيدة الحركة وتكون في الحالة الصلبة.

ب. طاقة التسامي المولية أكبر من طاقة التبخر المولية.

لأنه عند تحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية؛ يتطلب تزويد جزيئات الماء بكمية من الطاقة تساوي مجموع كمية الطاقة اللازمة للانصهار وكمية الطاقة اللازمة للتبخر.

5. أحسب المتغيرات: إذا كان المحتوى الحراري للمواد الناتجة لتفاعل ما (90kJ)، وللمواد المتفاعلة (10kJ)، فكم

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهي

يكون التغير في المحتوى الحراري للتفاعل؟ وما إشارته؟




$$\Delta H = H_{pr} - H_{re}$$



لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك

$$\Delta H = 90 \text{ kJ} - 10 \text{ kJ} = + 10 \text{ kJ}$$



قياس الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود.

6. قام مجموعة من الطلاب بتجربة لقياس الطاقة المنبعثة من حرق أنواع مختلفة من الوقود السائل في المشعل، بتسخين (200ml) من الماء في وعاء معدني، وقد حصلوا على النتائج الآتية المبينة في الجدول، أدرس هذه النتائج، وأجب عن الأسئلة التي تليه:

اسم الوقود	كتلة الوقود المحترقة (g)	الارتفاع في درجة حرارة الماء في علب معدنية	ارتفاع درجة حرارة الماء لكل جرام من الوقود المحترق
الإيثانول	1.1	32	
البارافين	0.9	30	
بنزان	1.5	38	
أوكتان	0.5	20	

أ. من وجهة نظرك، كيف توصل الطلبة إلى حساب مقدار الوقود الذي حُرِقَ في كل تجربة؟
قياس كتلة المصباح ومكوناته قبل عملية الاحتراق
وبعده وإيجاد فرق الكتلة الذي يمثل كمية الوقود
المحترقة.

ب. أكمل العمود الأخير من الجدول بحساب الارتفاع في درجة حرارة الماء الناتج عن حرق غرام واحد من
الوقود .
الإيثانول: 29.1 ، البرافين: 33.3

بنتان: 25.3 ، أوكتان: 40

ج. ما الوقود الذي أنتج أعلى ارتفاع في درجة الحرارة لكل جرام تم حرقه؟ أوكتان

د. **أصف:** إذا تكررت تجربة الأوكتان باستخدام (400ml) من الماء في العلبة المعدنية؛ فما الارتفاع المتوقع في
درجة الحرارة تقريباً؟ أصف كيف توصلت إلى إجابتي.

يتوقع أن يكون حوالي (10°C) أي نصف الارتفاع
في درجة الحرارة، وذلك لأن كمية الحرارة الناتجة
نفسها تتوزع على كمية من الماء تساوي ضعف
الكمية المستخدمة في التجربة الأساسية.

هـ. **أفسر:** استخدمت مجموعة أخرى من الطلبة دورقاً زجاجياً بدلاً من العلبة المعدنية في تجاربهم. أية مجموعة
من الطلبة ستحصل على نتائج أكثر دقة؟


المجموعة التي تستخدم العلبة الفلزية؛ لأن العلبة
الفلزية أكثر قدرة على توصيل الحرارة من الوعاء

7. يحترق مول من الميثان (CH_4) بوجود كمية وافرة من الأكسجين لتكوين ثاني أكسيد الكربون (CO_2) والماء (H_2O)، وينتج عن ذلك كمية من الحرارة مقدارها (882kJ).




أ. أكتب معادلة كيميائية حرارية تعبر عن التفاعل.

ب. أرسم مخططاً يبين تغير المحتوى الحراري للتفاعل.



ب.



8. وعاء يحتوي (40g) من الماء درجة حرارته (حرارة الماء) (25°C)، أُجسبت درجة حرارة الماء النهائية؛ إذا وُضعت فيه قطعة من الألمنيوم كتلتها (25g) ودرجة حرارتها (60°C) درجة سيليزية.

كمية الحرارة التي يمتصها الماء = كمية الحرارة التي تفقدها قطعة الألمنيوم

$$q(\text{H}_2\text{O}) = - q(\text{Al})$$

$$m \cdot s \cdot \Delta t = - (m \cdot s \cdot \Delta t)$$

$$40 \times 4.18 (t_2 - 25) = - (25 \times 0.89 (t_2 - 60))$$

$$167.2 t_2 - 4180 = -22.25 t_2 + 1335$$

$$167.2 t_2 + 22.25 t_2 = 1335 + 4180$$

$$t_2 = \frac{5520}{189.45} = 29^\circ\text{C}$$

9. **أحسب** الحرارة النوعية لمعدن مجهول، إذا وُضِعَتْ قطعة منه كتلتها (20g)، ودرجة حرارتها (70°C)، في (40g) من الماء عند درجة حرارة (25°C)، فارتفعت درجة حرارة الماء بمقدار (3.5°C).

درجة الحرارة النهائية للمعدن = درجة الحرارة النهائية للماء

درجة الحرارة النهائية للمعدن = 28,5 °C

$$\Delta t(m) = 70 - 28.5 = 41.5^\circ\text{C}$$

$$q(w) = - q(m)$$

$$m \cdot s \cdot \Delta t = - (m \cdot s \cdot \Delta t)$$

$$40 \times 4.18 \times 3.5 = - (20 \times s \times (-41.5))$$

$$585.2 = 830 s$$

كل ملفات الإنترنت الأساسية والتوجيهية على موقع دبرني





10. **أحسب** كمية الحرارة اللازمة لتسخين قطعة من النحاس كتلتها (15g) من (22°C) إلى (60°C).



$$\Delta t = 60 - 22 = 38^\circ\text{C}$$

$$q = m \cdot s \cdot \Delta t = 15 \times 0.38 \times 38 = 722 \text{ kJ}$$

11. **أحسب** حرارة التفاعل (ΔH) باستخدام طاقة الروابط للتفاعلين الآتيين:



التفاعل الأول

$$\Delta H = \sum BE_{pr} - \sum BE_{re}$$

$$\Delta H = (H-H) + (I-I) - 2(H-I)$$


$$\Delta H = (436 + 149) - 2(295) = -5 \text{ kJ}$$

التفاعل الثاني

$$\Delta H = (N \equiv N) + 3(H-H) - 6(N-H)$$

$$\Delta H = (942) + 3(436) - 6(386) = -66 \text{ kJ}$$

12. الهيدرازين السائل (N_2H_4) هو أحد أنواع الوقود المستخدم في المركبات الفضائية، أحسب حرارة التفاعل الناتجة عن تكوين الهيدرازين. وفق المعادلة الآتية:



كل ملفات الصفوف الاساسية والتوجيهي
على موقع دبرني



علمًا بأن:




لا تنسى تحمل تطبيق دبرني على تلفونك



نعكس المعادلة (1) ، و نضرب المعادلة (2) بـ (2) ؛ ثم نجمع المعادلتين الجديدتين :



13. يتكون رابع كلوريد الكربون (CCl_4) بتفاعل غاز الميثان (CH_4) مع غاز الكلور (Cl_2)، وفق المعادلة الآتية:




باستخدام حرارة التكوين القياسية للمركبات في التفاعل أحسب حرارة التفاعل (ΔH°).

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{f(\text{pr})} - \sum \Delta H^\circ_{f(\text{re})}$$

$$\Delta H^\circ = (4\Delta H^\circ_f(\text{CCl}_{4(l)}) + 4\Delta H^\circ_f(\text{HCl}_{(g)})) - \Delta H^\circ_f(\text{CH}_{4(g)})$$

$$\Delta H^\circ = 4(-139) + 4(-92.3) - (74.8) = -433.4 \text{ kJ}$$

14. يحترق غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) بوجود كمية كافية من الأكسجين، وفق المعادلة الآتية:



كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهية
على موقع دبني

أحسب كمية الحرارة الناتجة عن احتراق (29.5 g) منه، علماً بأن الكتلة المولية لكبريتيد الهيدروجين $= 34 \text{ g/mol}$.



لا تنسى تحمل تطبيق دبني على تلفونك

• نحسب عدد مولات كبريتيد الهيدروجين H_2S :

$$n = \frac{m}{Mr} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{29.5}{34} \quad \Rightarrow \quad n = 0.87 \text{ mol}$$


• إشارة (ΔH) سالبة فالتفاعل طارد للحرارة؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي:



$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ mol} & & 1036 \text{ KJ} \\ 0.87 \text{ mol} & \xrightarrow{\quad} & q \text{ KJ} \end{array}$$

$$q \text{ KJ} = \frac{1036 \times 0.87}{2} = 450.66 \text{ KJ}$$

15. يحترق الجلوكوز في الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة لقيام الخلايا بالوظائف المختلفة؛ وفق المعادلة الآتية:



فإذا كانت الطاقة التي يحتاجها لاعب كرة سلة خلال الساعة التدريبية الواحدة تساوي (2100kJ)، فأحسب أقل كتلة من السكر يتم حرقها؛ إذا تدرب اللاعب لمدة ساعتين، علماً بأن الكتلة المولية للجلوكوز = (180g/mol).

• إشارة (ΔH) سالبة فالفاعل طارد للحرارة ؛ تكتب المعادلة الحرارية كالتالي :



1 mol


X mol

2820 KJ

4200 KJ

$$X \text{ mol} = 4200 \times \frac{1}{2820} = 1,5 \text{ mol}$$

كل ملفات الصفوف الأساسية والتوجيهية على موقع دبرني



• نحسب كتلة السكر $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: لا تنسى تحميل تطبيق دبرني على تلفونك

$$n = \frac{m}{Mr}$$

$$1,5 = \frac{m}{180}$$

$$m = 180 \times 1,5$$

$$m = 270 \text{ g}$$

ينمي العقل ويزيده يقيناً
تراهم في طريقي هائمين

إن الكيمياء والعقل فينا
إذا قوم هموا إلى اختراع